

Glicerines végbélkúp

2 g, ill. 3 g

Mielőtt elkezdené gyógyszerét alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót. Ez a gyógyszer orvosi vény nélkül kapható. Az optimális hatás érdekében azonban elengedhetetlen e gyógyszer körültekintő alkalmazása.

- Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.
- További információkért vagy tanácsért forduljon gyógyszerészéhez.
- Sürgősen keresse fel orvosát, ha tünetei nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.

Milyen típusú gyógyszer a Glicerines végbélkúp 2 g, 3 g és milyen betegség esetén alkalmazható?

A Glicerines végbélkúp 2 g, 3 g a székelési inger kiváltására alkalmas és ennek megfelelően hashajtó hatású gyógyszer.

Mit tartalmaz a Glicerines végbélkúp 2 g, 3 g?

Hatóanyag:

Glicerines végbélkúp 2 g összetétele:

Glicerin 1,64 g

Palmitinsav 0,048 g

Sztearinsav 0,102 g

Glicerines végbélkúp 3 g összetétele:

Glicerin 2,46 g

Palmitinsav 0,072 g

Sztearinsav 0,153 g

Segédanyagok: Tisztított víz, nátrium-hidroxid.

Mikor nem alkalmazható a Glicerines végbélkúp 2 g, 3 g?

A hatóanyaggal vagy a segédanyagokkal szembeni túlérzékenység, súlyos hasi fájdalmak esetén nem alkalmazható.

Tartós rendszeres használata csak orvosi javallatra megengedett.

Mikor kell a Glicerines végbélkúp 2 g, 3 g alkalmazása előtt feltétlenül tanácsot kérni a kezelőorvostól?

Súlyos hasi fájdalom mellett fennálló székrekedés esetén forduljon kezelőorvosához.

Mit kell figyelembe venni terhesség és szoptatás során?

A készítmény biztonságosságára vonatkozóan nem állapítottak meg különleges kockázatot a terhesség és a szoptatás időszakában.

Alkalmazható-e a Glicerines végbélkúp 2 g, 3 g gyermekkorban?

Gyermekeknek a Glicerines végbélkúp 2 g alkalmazható. Adagolást lásd később.

Mire kell figyelemmel lenni a Glicerines végbélkúp 2 g, 3 g alkalmazásakor?

Rendszeres alkalmazása megszokáshoz vezethet, esetleg végbéligalmat, gyulladást okozhat.

Befolyásolja-e a készítmény a gépjárművezetéshez és a gépek üzemeltetéséhez szükséges képességeket?

A készítmény a gépjárművezetéshez és a gépek üzemeltetéséhez szükséges képességeket nem befolyásolja.

Milyen más anyagok befolyásolhatják a Glicerines végbélkúp 2 g, 3 g hatását?

Klinikailag jelentős gyógyszerkölsönhatás és egyéb kölsönhatás nem ismert.

Milyen mennyiségben kell alkalmazni a Glicerines végbélkúpot (2 g, 3 g) és milyen gyakran?

Szükség esetén felnőtteknek 1-2 (3 g-os), gyermekeknek 3-6 éves korig 1/2 (2 g-os) kúpot, 6-14 éves korig 1 (2 g-os) kúpot kell a végbélbe helyezni.

Alkalmazása csak szükség esetén és alkalomszerűen javasolt. Tartós és rendszeres használata csak orvosi javallatra, az orvos által előírt adagban és ideig megengedett.

Milyen mellékhatásokat okozhat a Glicerines végbélkúp 2 g, 3 g?

Rendszeres alkalmazása megszokáshoz vezethet, esetleg végbéligalmat, gyulladást okozhat.

Ha bármilyen egyéb mellékhatást vagy utóhatást tapasztalna, ami nem szerepel ebben a beteg-tájékoztatóban, forduljon kezelőorvosához.

Amennyiben mellékhatások miatt kívánja abbahagyni a kezelést, kérjen tanácsot kezelőorvosától, aki tájékoztatni fogja e mellékhatások kezeléséről, vagy más készítménnyel folytatja a kezelést.

Mi a teendő, ha a Glicerines végbélkúpot (2 g, 3 g) lenyelte?

Értesítse kezelőorvosát, vagy az orvosi ügyeletet.

Hogyan kell tárolni a készítményeket?

Szobahőmérsékleten 25 °C alatt.

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!

A készítmény csak a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül használható fel.

Forgalomba hozatali engedély jogosultja:

TEVA Gyógyszergyár Rt., Debrecen

OGYI-T-13146/01 (Glicerines végbélkúp 2 g)

OGYI-T-13147/01 (Glicerines végbélkúp 3 g)

Beteg-tájékoztató OGYI-eng. száma: 28.894/41/2004