BETEGTÁJÉKOZTATÓ

Mielőtt elkezdené a gyógyhatású készítményt alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót.
E recept nélkül kapható gyógyhatású szert Ön orvosi felügyelet nélkül alkalmazhatja az alábbiakban meghatározott betegségek megelőzésére ill. kezelésére. Az optimális hatás érdekében azonban, elengedhetetlen a készítmény körültekintő, előírásszerű alkalmazása.
Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.

REVALID® kapszula

Mi a Revalid® kapszula?
Gyógyszernek nem minősülő, haj- és körömregeneráló hatású készítmény, melynek hatását klinikai vizsgálatok bizonyították.

Milyen hatása van a Revalid® kapszulának?
Megállítja a hajhullást, serkenti a hajnövekedést. Kedvezően befolyásolja a korpásodást, a viszketést, a seborrhoeát. Erősíti a körmöket. A Revalid® kiegészíti a napi táplálékot, tartalmazza a hiányzó építő és regulator anyagokat a haj, illetve a köröm optimális növekedése, fejlődése és megújulása szempontjából. A Revalid® ellátja a hajat és a körmöket a szükséges anyagokkal:
- a hajhagymák felépítéséhez,
- az alsó bőrrétegek erősítéséhez,
- a hajfelszín jó küllemének fenntartásához.

Mi a Revalid® kapszula hatóanyaga?
Hatóanyagok: 100 mg metionin (DL-methioninum), 50 mg cisztin (L-cystinum), 50 mg kalcium pantotenát (calcii panthotenas), 50 mg köles- és 50 mg búzacsíra kivonat (Millii flavi et Tritici germinis extr.), 50 mg orvosi élesztő (Faex medicinalis), 20 mg paraamino-benzoesav (acidum p-amino-benzoicum), 10 mg B_6-vitamin (pyridoxini hydrochloridum), 1,5 mg B_1-vitamin (thiamini hydrochloridum), nyomelemek (Aminochel) [2 mg vas (ferrum), 2 mg cink (zincum), 0,5 mg réz (cuprum)] komplex kötésben/kapszula.

Mit tartalmaz még a készítmény?
Segédanyagok: kolloid szilícium-dioxid, akáciamézga, a kapszulahéjban zselatin, valamint kinolinsárga (E 104) és indigokarmin (E 132) színezőanyagok.

Milyen esetben alkalmazza a Revalid® -ot?
A készítmény alkalmazható különböző eredetű hajhullás, kopaszodás megállítására, lassítására az alábbi esetekben;
- valamely betegség vagy gyógyszeres kezelés következményeként, várandós állapot ideje alatt kialakult hajhullás (első trimeszter kivételével), valamint kimerültség, rossz általános állapot, nem kielégítő táplálkozás miatt kialakult h a j h u l l á s kezelésére,
- hajnövekedési zavarok kezelésére és a hajszerkezet javítása törékeny, fénytelen haj esetén,
- a köröm növekedésének és küllemének nem fertőzéses eredetű rendellenességeinek kezelésére.

Milyen esetben ne alkalmazza a Revalid® -ot?
- A készítményt ne alkalmazza, ha valamely alkotó komponenssel szemben egyéni túlérzékenysége (allergiás) van!
- Nem javallott hormonális zavarok által okozott hajhullásnál és fertőzéses eredetű körömbetegségek esetén.
- Ne alkalmazza a készítményt súlyos májbetegség fennállásakor, urát- vagy foszfáttípusú vesekőbetegségben, savtúltengés esetén.

Mit kell tudnia az alkalmazás megkezdése előtt?
Tudnia kell, hogy nincs-e a készítmény alkalmazását kizáró ok. Gondolja végig a következőket: szed-e más gyógyszereket (elsősorban vitaminokat, ásványi anyagokat vagy ezek kombinációit). Ha igen, vegye figyelembe ezen gyógyszerek vitamin és/vagy ásványi anyag tartalmát.

Szedhetik-e a készítményt gyermekek?
Gyermekeknek 14 éves életkor alatt nem adható.

Szedhető-e a készítmény más gyógyszerekkel?
A Revalid® kapszula alkalmazását meg kell szakítani, ha bakteriális fertőzés miatt az orvos szulfonamid kezelést ír elő, mivel annak hatását a Revalid® csökkentheti. A Revalid® kapszula nem szedhető levodopa-tartalmú készítményekkel sem.

Mit kell megfontolni várandósság- és szoptatás ideje alatt?
Ezen élethelyzetekben a készítmény szedésének megkezdése előtt kérjen tanácsot szakembertől.

Hogyan és mikor kell szedni a Revalid®-ot?
Az előírt adagolásban közvetlenül étkezés előtt vagy közben, kevés folyadékkal kell bevenni.

Mi az ajánlott adag?
Felnőtteknek és 14 éven felüli gyermekeknek 3x1 kapszula naponta. Súlyos esetekben célszerű a kúrát napi 3x2 kapszula formájában kezdeni, majd az első hónap elteltével át lehet térni a fenntartó kezelésre, melynek szokásos adagolása 3x1 kapszula naponta.

Mire kell még ügyelnie a készítmény szedése során?
A nem kielégítő táplálkozás, valamint káros fizikai vagy kémiai behatások (pl. festés, dauer stb.) a haj betegségeit és növekedésének zavarait gyakran nagymértékben befolyásolhatja. A táplálkozás tekintetében a lehetséges mértékig kiegyensúlyozottságra és változatosságra ajánlatos törekednie, kerülni a szigorú korlátozó diétákat (vegetáriánus vagy túlzottan kalóriaszegény táplálkozás). Lehetőség szerint a körmök védelmére ajánlatos a háztartási munkákhoz gumikesztyű használata.

Mennyi ideig szedhető a készítmény?
A Revalid® kúra rendszerint 2-3 hónapig tart. Legtöbbször a kúra első hónapja során megáll a kóros hajhullás, és 2-3 hónap múlva a hajszerkezet jelentős változása figyelhető meg. Szükség esetén a kúra meghosszabbítható vagy megismételhető.
Ha egy adagot elfelejt bevenni, a készítmény szedését változtatás nélkül folytathatja.

Milyen nem kívánt hatást válthat ki a Revalid® kapszula?
Napi 6 kapszula adagolásánál esetenként enyhe emésztési zavarok, ritkán fejfájás, ingerlékenység jelentkezhetnek, ilyenkor az adagot napi 3x1 kapszulára kell csökkenteni. Ha Ön bármilyen egyéb mellékhatást tapasztalna – amely nem szerepel ebben a tájékoztatóban – hagyja abba a készítmény alkalmazását!

Hogyan tárolja a készítményt?
A készítmény gyermekektől elzárva tartandó!
A csomagoláson feltüntetett lejárati idő után a készítményt ne használja!

Csomagolási egység: 30 db, 90 db

Tárolás: legfeljebb 25 °C-on, nedvességtől védve

Nyilvántartási szám: OGYI -197/1991

Forgalomba hozatali engedély jogosultja: TEVA Gyógyszergyár zRt.,
4042 Debrecen, Pallagi út 13. az Ewopharma AG.
Svájc licence alapján

TEVA

265882907

www.gyogyszerkereso.hu