

HUMA-Pronol 40 mg tabletta

Mielőtt elkezdene gyógyszerét alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegájékoztatót.

- Tartsa meg a betegájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.
- További kérdéseivel forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez.
- E gyógyszert az orvos személyesen Önnek írta fel. A készítményt másoknak átadni nem szabad, mert számukra ártalmas lehet még abban az esetben is, ha tünetei az Önéhez hasonlóak.

A betegájékoztató tartalma:

1. Milyen típusú gyógyszer a Huma-Pronol tabletta és milyen betegségek esetén alkalmazható?
2. Tudnivalók a Huma-Pronol tabletta szedése előtt
3. Hogyan kell alkalmazni a Huma-Pronol tablettát?
4. Lehetséges mellékhatások
5. Tárolás

Huma-Pronol 40 mg tabletta

Hatóanyag: 40 mg propranolol-hidroklorid tablettánként.

Segédanyagok: magnézium-sztearát, laktóz-monohidrát (120 mg), povidon, kukoricakeményítő.

Küllem: Tabletta: fehér színű, szagtalan, keserű ízű, korong alakú, mérsékelt domború felületű tabletta.

Csomagolás: 50 db tabletta bliszterben, faltkartonban.

Gyártó és a forgalombahozatali engedély jogosultja:

TÉVA Gyógyszergyár Részvénytársaság

1. MILYEN TÍPUSÚ GYÓGYSZER A HUMA-PRONOL TABLETTA ÉS MILYEN BETEGSÉGEK ESETÉN ALKALMAZHATÓ?

- magas vérnyomás,
- egyes szív-érrendszeri betegségek,
- migrén,
- ismeretlen eredetű remegés,
- pajzsmirigybetege, mellékvese-daganat, ill. szorongás okozta gyors szívverés kezelésére és megelőzésére.

2. TUDNIVALÓK A HUMA-PRONOL TABLETTA SZEDÉSE ELŐTT

Ne alkalmazza a készítményt:

- ha túlérzékeny a készítmény hatóanyagára vagy bármely segédanyagára,
- rosszzabodó szívelégtelenségben,
- amennyiben asztmás, ill. hörgőgörcsrel járó betegség szerepel a kórelőzményben,
- nagyon lassú szívverés esetén,
- szív eredetű sokkban,
- alacsony vérnyomás esetén,
- a vér elsavasodása esetén,
- hosszú idejű koplaláskor,
- súlyos végtagi keringési zavarokban,
- egyes ritmuszavarokban,
- kezeletlen mellékvese-daganat esetén,
- koszorúér-betegség okozta mellkasi fájdalom bizonyos eseteiben.

Egyedi orvosi elbírálás alapján adható:

- egyes szívbetegségekben,
- súlyos májcirrhózisban.

Terhesség, szoptatás

A propranolol hatással van a méhlepény vérkeringésére, ezáltal a magzat vérellátására, illetve megjelenik az anyatejben. Ennek megfelelően *terhesség* ideje alatt csak feltétlenül szükséges esetben, a kezelőorvos egyedi elbírálása után alkalmazható a készítmény.

Szoptatás ideje alatt a készítmény alkalmazása nem javasolt.



A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és gépek kezeléséhez szükséges képességekre
A járművezetői képességet és a baleseti veszéllyel járó munka végzését befolyásolhatja (pl. szédülés, gyengeség), amikor is ilyen tevékenységet folytatni nem szabad. Az orvos az észlelt mellékhatások alapján egyedileg határozza meg az esetleges korlátozás, ill. tilalom mértékét.

Fontos információk a készítmény egyes összetevőiről:

Tejcukor-érzékenységben figyelembe kell venni, hogy a készítmény 120 mg tejcukrot is tartalmaz tablettánként.

A kezelés ideje alatt szedett egyéb gyógyszerek:

Egyes gyógyszerek jelentősen módosíthatják a készítmény hatását, illetve a Huma-Pronol hatóanyaga, a propranolol is hatással lehet más gyógyszerekre.

Ez esetlegesen súlyos gyógyszer-kölcsönhatásokhoz vezethet, ezért a készítmény alkalmazása előtt minden esetben tájékoztassa orvosát az egyéb alkalmazott gyógyszerekről, beleértve a vény nélkül kaphatókat is. Feltétlenül tudnia kell orvosának, amennyiben Ön egyes kalcium-csatorna blokkolókat, dihidropiridin-származékokat, szivglikozidokat, cukorbetegség elleni szereket, a szimpatikus idegrendszer működését befolyásoló gyógyszereket, rezerpin-, lidokain-, cimetidin-, hidralazin-, klórpromazin-, ergotamin-, dihidroergotamin-tartalmú gyógyszereket szed. Műtéti beavatkozás előtt az altatórvozt tájékoztatni kell a propranolol-kezelésről.

3. HOGYAN KELL ALKALMAZNI A HUMA-PRONOL TABLETTÁT?

Kizárólag az orvos utasítása szerint, az általa egyénileg meghatározott adagban és ideig szedhető, ettől eltérni nem szabad.

Ha az előírnál több tablettát vett be:

Mivel a túladagolás tünetei először jelentéktelenek lehetnek, s csak laboratóriumi eltérések mutathatók ki, túladagolás esetén azonnal keresse meg kezelőorvosát, s tájékoztassa a bevett mennyiségről, illetve a bevétel idejéről. Mivel a tünetek, különösképpen a szív-érrendszeri hatások hirtelen, súlyos formában jelentkezhetnek, a kezelőorvos vagy rendelőintézet haladéktalan felkeresése igen fontos. A további intézkedéseket kezelőorvosa határozza meg.

Ha adagját elfelejtette bevenni:

Következő alkalommal ne vegyen be dupla adagot, mert ezzel már nem pótolja a kiesett mennyiséget, viszont a túladagolás veszélyének tenné ki magát. Folytassa a készítmény alkalmazását az eredeti adagolás szerint.

A kezelés hirtelen megszakítása:

Ha bármilyen okból megszakította a kezelést, haladéktalanul értesítse erről orvosát. Ő dönt a kezelés esetleges folytatásáról vagy egyéb gyógyszer alkalmazásáról, illetve az adagolásról.

4. LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK

Mint minden gyógyszernek, a Huma-Pronolnak is lehetnek mellékhatásai.

Szopora szívverés, a fennálló szívproblémák súlyosbodása jelentkezhethet. Ritkábban alacsony vérnyomás (esetleg eszméletvesztéssel), hideg végtagok, zavartság, szédülés, hangulati ingadozás, alvászavarok, hányás, hányinger, hasmenés, székrekedés, hasi görcsök, bőrkírtések, látászavar, fülszűrés, halláscsökkenés, fáradtság és/vagy kimerültség (gyakran csak átmeneti) fordulhat elő.

A készítmény egyik igen ritka, de potenciálisan súlyos kimenetelű mellékhatása a hörgőgörcs, ami elsősorban olyan betegekben fordulhat elő, akiknek kórtörténetében asztma vagy asztmás rosszullét szerepel.

Tájékoztassa orvosát, amennyiben a mellékhatások tartósságát vagy súlyosbodását észleli, s akkor is, ha olyan nemkívánatos tünetet észlel, ami ebben a tájékoztatóban nem szerepel.

5. TÁROLÁS

15 °C – 30 °C között, fénytől és nedvességtől védve tartandó.

A készítmény csak a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül használható fel.

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó.

OGYI-T-3813/01

Betegtájékoztató OGYI-eng. száma: 29 000/41/2004

HP 7200