



BETEGTÁJÉKOZTATÓ



DAEDALON® tabletta

Mielőtt elkezdené gyógyszerét alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót. Ez a gyógyszer orvosi vény nélkül kapható. Az optimális hatás érdekében azonban elengedhetetlen e gyógyszer körültekintő alkalmazása.

- Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.
- További információért vagy tanácsért forduljon gyógyszerészéhez.
- Sürgősen keresse fel orvosát, ha tünetei 2 napon belül nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.

A betegtájékoztató tartalma:

1. Milyen típusú gyógyszer a Daedalon tabletta és milyen betegségek esetén alkalmazható?
2. Tudnivalók a Daedalon tabletta szedése előtt
3. Hogyan kell alkalmazni a Daedalon tablettát?
4. Lehetséges mellékhatások
5. Tárolás

Hatóanyag:

50,0 mg dimenhidrinát tablettánként.

Segédanyagok: magnézium-sztearát, talkum, mikrokristályos cellulóz, vízmentes kolloid, szilícium-dioxid.

Küllem: Tabletta: fehér vagy csaknem fehér színű, szagtalan, lapos, korong alakú, metszett élű, egyik oldalán mélynyomású "m" jelzéssel ellátott tabletta.

Csomagolás: 10 db tabletta szintelen, átlátszó PVC//Al buborékfóliában és dobozban.

Gyártó és a forgalomba hozatali engedély jogosultja:

Richter Gedeon Nyrt., Budapest

1. Milyen típusú gyógyszer a Daedalon tabletta és milyen betegségek esetén alkalmazható?

A Daedalon tabletta különböző eredetű hányinger és hányás megelőzésére és kezelésére szolgál. Alkalmazható többek között bármely jármű kiváltotta utazási betegségben, különféle hányingert kiváltó eszközös vizsgálatok előtt, vagy szédüléssel is járó középfül eredetű émelygésor (például Ménière szindróma).

2. TUDNIVALÓK A DAEDALON TABLETTA SZEDÉSE ELŐTT

Nem alkalmazható a Daedalon tabletta:

- A hatóanyaggal, ill. a készítmény összetevőivel szembeni túlérzékenység esetén.
- Görcsös állapotokban (eklampszia, epilepszia).
- Veseelégtelenség.
- Zöldhályog (zárt zugú glaukóma).
- Megnövekedett koponyaűri nyomás esetén (pl. fejsérülés után).
- Szoptatás ideje alatt.
- 6 év alatti életkor.

Fontos információk a kezelés megkezdése előtt:

Feltétlenül kérjen tanácsot orvosától:

- az alábbi betegségek fennállása esetén: emelkedett szembelnyomás, prosztata megnagyobbodás és vizeletürítési zavarok, asztma, magas vérnyomás, súlyos koszorúér betegség, vese- és májelégtelenség.

A Daedalon tabletta együttes alkalmazása étellel/itallal

A Daedalon tabletta szedésekor ne fogyasszon alkoholt!

A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és gépek üzemeltetéséhez szükséges képességekre

A gyógyszer szedése álmoságot, bágyadtságot, szédülést, a reakcióidő megnövekedését okozhatja, ezért ezen tünetek jelentkezésekor gépjárművet vezetni vagy baleseti veszéllyel járó munkát végezni tilos.



Terhesség és szoptatás

Terhesség

A terhességre vonatkozóan nincsenek adatok. Terhesség alatt csak az előny/kockázat gondos mérlegelésével és csak akkor alkalmazható, ha a terhességi hányás már nagyfokú elektrolit veszteséghez vezetett.

Szoptatás

A dimenhidrinát kis mennyiségben ájtat az anyatejbe, ezért szoptatás ideje alatt a készítményt nem szabad alkalmazni.

Egyéb gyógyszerek alkalmazása (gyógyszerkölcshatás):

Ha egyéb gyógyszert is szed, különös tekintettel az alábbi gyógyszerekre: alátatók, nyugtatók és egyéb pszichiátriai gyógyszerek, Parkinson kór elleni gyógyszerek, görcsoldók, egyes antibiotikumok, feltétlenül kérjen tanácsot orvosától.

3. HOGYAN KELL ALKALMAZNI A DAEDALON TABLETTÁT?

Amennyiben nem biztos az adagolást illetően, kérdezze meg kezelőorvosát vagy gyógyszerészét.

Amennyiben a kezelőorvos másképpen nem rendeli, a készítmény szokásos adagja:

Felnőtteknek és 12 év feletti gyermekeknek: naponta 4–6 óránként 1–2 tableta, a legnagyobb napi adag 8 tableta.

6–12 éves gyermekeknek: naponta 2–3-szor ½–1 tableta (összesen napi 5 mg/ttkg).

Utazási betegség megelőzésére az első adagot az utazás megkezdése előtt ½ órával kell bevenni.

Amennyiben a tünetek (hányinger, hányás) a gyógyszeredés ellenére 2 nap után is fennállnak, illetve

egyéb tünetek is jelentkeznek, azonnal keresse fel kezelőorvosát!

Ha az előírtnál több Daedalon tablettát vett be:

Ha az előírtnál több Daedalon tablettát vett be, azonnal forduljon orvoshoz!

Ha elfelejtette bevenni adagját:

A soron következő előírt adagolási időpontban ne alkalmazzon dupla adagot.

4. LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK

Mint minden gyógyszernek, a Daedalon tablettának is lehetnek mellékhatásai.

Gyakran álmoság, bágyadság, fáradtság, reakcióidő megnövekedés. A kezelés során észlelt mellékhatásokról vagy bármilyen szokatlan tünetről mielőbb tájékoztassa orvosát!

A Daedalon tableta igen nagy adagjainak bevétele után kialakulhatnak a túladagolás tünetei: görcsök, érzékszélőzások (hallucinációk), izgatottság, légzési nehézségek, ájulásérzés, mely tünetek jelentkezése esetén azonnal forduljon orvoshoz!

5. TÁROLÁS

Különleges tárolást nem igényel.

A gyógyszert a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni.

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó.

OGYI-T3120/01

Betegtájékoztató OGYI-eng. száma:
17006/41/07