

Betegtájékoztató

30 ml

PHLOGOSOL oldat

- *Mielőtt elkezdene alkalmazni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót!*
- *Ez a gyógyszer orvosi vény nélkül kapható, mellyel Ön enyhe múltó panaszokat kezelhet orvosi felügyelet nélkül. Az optimális hatás érdekében azonban elengedhetetlen e gyógyszer körültekintő alkalmazása.*
- *Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet!*
- *További kérdéseivel forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez!*
- *Sürgősen keresse fel orvosát, ha tünetei néhány napon belül nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak!*

Mi a Phlogosol oldat, és milyen betegségek kezelésére szolgál?

Hatóanyagok 1 ml oldatban: Nátrium-szamárium-diszulfoszalicilát 30 mg, hexaklorofén 1 mg.
Egyéb összetevők, segédanyagok: nátrium-edetát, borsmentaolaj, levomentol, propilparahidroxibenzoát, 96%-os etanol, propilénlikol, tisztított víz.

Helyi fertőtlenítő és gyulladáscsökkentő hatású készítmény.

Javallatok:

A készítmény külsőleg a száj ill. a torok öblögetésére, ecsetelésére használható az alábbi megbetegedések esetén:

- Meghúléssel járó torokfájás,
- Influenzajárvány esetén a cseppfertőzés megelőzése,
- Heveny garat-, mandula-, gége-, szájnyálkahártya-, és fogínygyulladás,
- Krónikus garatgyulladás,
- Herpeszes szájnyálkahártya-gyulladás,
- A nyelv felületes gyulladása,
- Fekélyes fogínygyulladás, fogágygyulladás,
- Foghúzás elő- és utókezelése, száj- és garatúri műtétek utókezelése,
- Kiújuló afta,
- A szájnyálkahártya műfogsor, forró étel, vegyszer okozta sérülései.

Mikor nem szabad a Phlogosol oldatot alkalmazni?

Ellenjavallatok:

- Bármely összetevővel szembeni túlérzékenység (allergia) esetén.
- Belsőleg nem használható!
- 2 éves kor alatti gyermekek kezelésére nem ajánlott.
- Mandulaműtétet követően csak 10-12 nap múlva alkalmazható, mert a sebet fedő lepedék korai leválása késői utóvérzést okozhat.
- Nem használható a szem és hüvely nyálkahártyáin, sérült vagy égett bőrön, bőrgyógyászati megbetegedések esetén.

Miről kell tájékoztatni a kezelőorvost a Phlogosol oldat alkalmazása előtt?

- Az aktuálisan szedett gyógyszerekről.
- Terhesség vagy szoptatás tényéről.

Hogyan kell alkalmazni a Phlogosol oldatot?

Száj-, és toroköblögetésre:

Felnőttek és öblögetni tudó gyermekek esetén 1 dl vízhez vagy kamilla teához 1-2 kávéskanál Phlogosol oldatot adni, jól elkeverni, majd az így elkészített oldattal szükség szerint naponta 3-5 alkalommal lehet öblögetni.

Ecsetelésre:

A kezelendő felületet a higítatlan oldattal naponta 3-5 alkalommal ecsetelni.

Belsőleg nem alkalmazható! Lenyelni nem szabad!

Különleges figyelmeztetések:

Amennyiben a tünetek egy héten belül nem javulnak, vagy az alapbetegségen kívül egyéb tünetek (pl. láz, fejfájás, emelygés, hányás) jelentkeznek, orvoshoz kell fordulni.

Hosszabb ideig kizárólag az orvos utasítására az általa előírt adagban alkalmazható!

A táplálkozást, ivást, fogmosást a készítmény alkalmazása után 1-2 órán át kerülni kell.

Mit kell tenni a Phlogosol oldat túladagolása esetén?

Használata során ez ideig túladagolás nem fordult elő.

A hexaklorofén extrém magas adagjának gyomorba jutása esetén, vagy nagy felületű égett, sérült bőrfelzínről felszívódva a gyógyszer gyomor-bél görcsöket, hasmenést, izomrángást, vérnyomásesést, zavartságot okozhat.

Forduljon azonnal orvoshoz!

Milyen nem kívánatos mellékhatások léphetnek fel a Phlogosol oldat alkalmazása közben?

Előírás szerinti alkalmazása során a mellékhatások általában ritkák. Arra érzékeny egyéneknél –bár a Phlogosol esetében erre nincs adat– a készítmény hexaklorofén tartalma fényérzékenységet, bőrreakciókat okozhat.

Ha mellékhatást, vagy az itt felsoroltakon túl bármilyen egyéb szokatlan tünetet észlel, értesítse orvosát, aki dönt a szükséges teendőről!

Alkalmazható-e a Phlogosol oldat terhesség és szoptatás idején?

A hexaklorofén állatkísérletekben szájon át adva vagy nagy bőrfelzínén alkalmazva magzatkárosító hatású, az anyatejbe átjut.

A készítmény hatásai a gépkjrművezetéshez és gépek üzemeltetéséhez szükséges képességekre:

Nem várható hatás kialakulása ezekre a képességekre.

Hogyan kell tárolni a Phlogosol oldatot?

A készítmény csak a csomagolás feltüntetett lejárati időn belül használható fel.

Legfeljebb 25°C-on tárolandó.

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!

További információk:

Orvosi rendelvény nélkül is kiadható gyógyszerkészítmény (VN).

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:



Pannonpharma Kft., Pécs

OGYI-T-3405/01

A betegtájékoztató OGYI-eng. száma: 31182/55/03.

A betegtájékoztató engedélyezésének dátuma: 2005. június 10.

Fischer

CMPHGOLD30UTV00