

Mielőtt elkezdené gyógyszerét alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegájékoztatót.

- Ez a gyógyszer orvosi vény/rendelvény nélkül kapható. Az optimális hatás érdekében azonban elengedhetetlen e gyógyszer körültekintő és szakszerű alkalmazása.
- Tartsa meg a betegájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.
- További kérdéseivel forduljon gyógyszerészeéhez.

A betegájékoztató tartalma:

1. Milyen típusú gyógyszer a Folsav 3 mg tabletta és milyen betegségek esetén alkalmazható?
2. Tudnivalók a Folsav 3 mg tabletta szedése előtt
3. Hogyan kell alkalmazni a Folsav 3 mg tablettát?
4. Lehetséges mellékhatások
5. Tárolás

Folsav 3 mg tabletta

Hatóanyag: 3,00 mg folsav tablettánként.

Segédanyagok: povidon K25, magnézium-sztearát, talkum, burgonyakeményítő, laktóz-monohidrát (120 mg).

Küllem: Tabletta: sárga színű kerek, lapos peremes tabletta.

Csomagolás: 50 db tabletta átlátszó bliszterben és faltkartonban.

Forgalomba hozatali engedély jogosultja:

VALEANT PHARMA Magyarország Kft., Budapest

Gyártók:

ALKALOIDA Zrt. 4440 Tiszavasvári, Kabay János u. 29. Magyarország

ICN Polfa Rzeszow S.A., ul. Przemyslowa 2, 35-959 Rzeszow, Lengyelország

1. Milyen típusú gyógyszer a Folsav 3 mg tabletta és milyen betegségek esetén alkalmazható?

Hatását úgy fejt ki, hogy a nukleinsav szintézisre hatva részt vesz az osztódó sejtek működésében és a vörösvértestek képzésében.

- Velőcsőzárási rendellenesség megelőzése, a periconceptionalis időszakban, illetve az első trimeszterben, ha terhességi anamnézisben már szerepelt ilyen rendellenesség
- Folsavhiányos állapotok megelőzése és kezelése.

2. Tudnivalók a Folsav 3 mg tabletta szedése előtt

Nem alkalmazható a gyógyszer:

- ha Ön a folsavra vagy a készítmény bármely összetevőjére túlérzékeny (allergiás),
- ha a vérszegénység oka nem tisztázott, illetve akikben B12-vitamin hiány áll fenn;
- ha folsav-függő daganatos betegségben szenved.

Tájékoztassa kezelőorvosát:

Minden jelenleg fennálló vagy régebben átvésztelt betegségéről.

A gyógyszer szedésének szükségességét, helyességét feltétlenül beszélje meg kezelőorvosával, ha vérszegénységét B12-vitamin hiány okozza (ilyenkor először B12 vitamint kell alkalmazni).

Egyéb gyógyszerek alkalmazása:

A kezelés megkezdése előtt feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát arról, hogy milyen gyógyszereket szed, beleértve a recept nélkül kapható készítményeket is. Más gyógyszerek egyidejű alkalmazása ugyanis megváltoztathatja a folsav hatását, illetve a folsav is befolyásolhatja más gyógyszerek hatását. Különösen fontos, hogy kezelőorvosa tudjon arról, ha Ön rendszeresen alkoholt fogyaszt, illetve, ha az alábbi gyógyszereket szedi:

- Központi idegrendszerre ható gyógyszerek (nyugtatók, fenitoin, epilepszia-ellenes készítmények);
- Bizonyos antibiotikumok illetve tbc ellenes szerek;

- Fogamzásgátlók;
- Folsav-antagonista gyógyszerek;
- Kolesztiramin (epesavkötő)
- Bizonyos, metformint tartalmazó, cukorbetegség elleni gyógyszerek.

A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és gépek üzemeltetéséhez szükséges képességekre

Nem áll rendelkezésre arra vonatkozó adat, hogy a készítmény hátrányosan befolyásolná a gépjárművezetéshez és gépek üzemeltetéséhez szükséges képességeket.

Terhesség és szoptatás

Terhességben az első harmadában a már előző terhességben előfordult velőcsőzáródási rendellenességek megelőzésére adható.

A folsav átjut az anyatejbe, ezért szoptatás idején csak az előny/kockázat mérlegelése mellett adható.

Fontos információk a készítményről:

Tejcukor érzékenység esetében figyelembe kell venni, hogy a készítmény tablettaként 120 mg tejcukrot is tartalmaz.

3. HOGYAN KELL ALKALMAZNI A FOLSAV 3 mg TABLETTÁT?

Ha az orvos másképp nem rendel, szokásos adagja:

- Felnőtteknek 4,5-6 mg/nap (1,5-2 tablettát) terhességi előzményben szereplő velőcső-záródási rendellenesség megelőzésére.
- Folsavhiányos megaloblasztos anémia kezelésére naponta 6 mg (2 tablettát) 3-4 hónapig,
- Felszívódási zavarokkal járó esetekben esetleg szükség lehet napi 15 mg (5 tablettát) folsav adagolására is.
- Krónikus hemolitikus állapotokban, mint pl. thalassaemia, sarlósejtes anémia fennállásakor a táplálkozástól vagy a hemolízis mértékétől függően szükség lehet naponta ill. hetente 6 mg (2 tablettát) folsav adására.
- Egyes esetekben vesedializált betegek számára is szükség lehet a folsavhiány megelőzése érdekében hasonló dózisban folsav pótlására.

Ha az előírtnál több tablettát vett be:

Azonnal tájékoztassa kezelőorvosát.

Ha elfelejtette bevenni az előírt adagot:

Következő alkalommal ne vegyen be dupla adagot, mert ezzel már nem pótolja a kiesett mennyiséget, viszont a túladagolás veszélyének tenné ki magát. Folytassa a kezelést az előírtak szerint.

4. LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK

Mint minden gyógyszernek a Folsav 3 mg tablettának is lehetnek mellékhatásai.

Mellékhatások ritkán, főleg nagy adagok alkalmazása esetén fordulnak elő. Ezek a következők lehetnek: étvágytalanság, rossz szájíz, hányinger, puffadás, fokozott bélgáz képződés, alvászavar, izgatottság, depresszió. Igen ritkán allergiás reakciók alakulhatnak ki.

A kezelés során észlelt mellékhatások vagy bármilyen szokatlan tünet jelentkezése esetén mielőbb tájékoztassa kezelőorvosát!

5. TÁROLÁS

15°C-30°C között, fénytől védve, száraz helyen tartandó.

A gyógyszert csak a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni.

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!

OGYI-T-2891/01

Betegtájékoztató szövegellenőrzésének dátuma: 2008.december 4.