

NEOMAGNOL tabletta

(VALEANT PHARMA Magyarország Kft.)

Mielőtt elkezdene gyógyszerét alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót.

Ez a gyógyszer orvosi vény nélkül kapható. Az optimális hatás érdekében azonban elengedhetetlen e gyógyszer körültekintő alkalmazása.

- Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.
- További információkért vagy tanácsért forduljon gyógyszerészéhez.
- Sürgősen keresse fel orvosát, ha tünetei nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.

Mi a NEOMAGNOL tabletta és mire használják?

A NEOMAGNOL tabletta - vízben feloldva higiénés kézfertőtlenítés, fogászati gyökérkezelés, kis felületű sebek, gyümölcs, mosható textiliák, rozsdamentes fémtárgyak, gumí-, műanyag tárgyak, orvosi kézeszközök, evőeszközök, konyhaedények, mosható bútorok, berendezési tárgyak, fésűk, kefék, borotválkozási eszközök, gumí-, műanyag gyermekjátékok, WC-, mosdókagylók, kádak, váladékgyűjtő edények és ivóvíz fertőtlenítésére szolgál.

Mit tartalmaz a NEOMAGNOL tabletta?

Hatóanyag: Klorogén-szeszkvihidrát 1000 mg tablettánként.

Segédanyagok:

Vizmentes kolloid szilícium-dioxid, karmellóz-nátrium, burgonyakeményítő.

Mikor nem alkalmazható a NEOMAGNOL tabletta?

A NEOMAGNOL tabletta nem alkalmazható a hatóanyagokkal vagy a készítmény bármely összetevőjével szembeni túlérzékenység esetén.

A tablettát bevenni nem szabad, mert mérgezést okoz!

Mit kell közölni kezelőorvosával a NEOMAGNOL tabletta használatának elkezdése előtt?

Tájékoztassa orvosát, ha Önél ismert gyógyszer vagy egyéb allergia.

Mit kell figyelembe venni terhesség és szoptatás során?

A NEOMAGNOL tabletta kúlsóleg biztonságosan alkalmazható a terhesség és a szoptatás során. Rákkeltő tulajdonságára vonatkozóan humán adat nem áll rendelkezésre.

Mit kell figyelembe venni gyermekek esetében?

A szert a gyermekek elől gondosan el kell zárni!

Mit kell betartani közúti forgalomban vagy gépek kezelése során?

A készítmény nem befolyásolja a gépjárművezetéshez és gépek kezeléséhez szükséges képességeket.

Milyen más gyógyszerek befolyásolhatják a NEOMAGNOL tabletta hatását?

Erre vonatkozóan adat nem áll rendelkezésre.

Hogyan használja a NEOMAGNOL tablettát?

Higiénés kézfertőtlenítésre: 1-2 tablettát 1 liter vízben feloldani, a szennyezett kezét először ebben kell 1-3 percig áztatni, majd szappannal kézmosást végezni.
Evőeszközök, ivóedényzet, konyhaedényzet fertőtlenítésére: 10 tablettát 1 liter vízben feloldani, a fertőtlenítenedő eszközöket 1-2 óráig áztatni, utána tiszta vízben öblíteni.
Fertőző betegnek mosható textíliái (fehérmű, ágymű) fertőtlenítésére: 10 vagy 20 tablettát 1 liter vízben feloldani, ebben az oldatban 2 órán át kell a ruhát áztatni, majd alaposan kiöblíteni. Az oldat a fehérműben foltot nem hagy és azt nem rongálja.
Gumi-, műanyag tárgyak, fésű, kefe, borotválkozási eszközök, gumi-, műanyag gyermekjátékok fertőtlenítésére: 20 tablettát 1 liter vízben feloldani és a tárgyakat 1-2 óráig áztatni. Fodrászületben használatos eszközök tisztántartására és fertőtlenítésére készített oldat naponkénti cseréje szükséges.
WC-, mosdókagylók, kádak, vécék gyűjtőedényzet fertőtlenítésére: 50 tablettát 1 liter vízben oldani. Az oldatot 1-2 órán át nem szabad a tárgyakról leöblíteni.
Ivóvíz fertőtlenítésére: 10 literenként 2 tablettát kell feloldani a fertőzött vízben, időnként össze kell keverni és legalább 2 óra időtartamig állni hagyni. Ennek eltelte után a víz fogyasztható!
Gyümölcs fertőtlenítésére: 2 tablettát 10 liter vízben feloldani, a gyümölcsöt 1/2-1 órán keresztül ebben kell áztatni. Tiszta vizes leöblítés után a gyümölcs fogyasztható!

Milyen mellékhatásokat okozhat a NEOMAGNOL tablettát?

A NEOMAGNOL tablettát alkalmazásakor a klóramin, klór és nátrium-hipoklorit okozhatnak panaszokat. Klóramin szemirritációt, könnyezést, szemhéjduzzanatot, tünetmentes szaruhártya-duzzanatot, a szaruhártya kimaródását okozhatja. Mind bőrirritációt, mind allergiás bőrreakció előfordulhat. Gyökérkezelés során a nátrium-hipoklorit gyökércsúcsra túli injektálása az ideg blokkolását eredményezheti. A klóramin- és a klórgáz belégzése köhögést, fulloklást és légzési nehézséget okozhat. A gázok nagymérvű belégzése vegyi tüdőgyulladást, tüdővízenyőt és a légzés összeomlását is eredményezheti. Ha a gázok jelentős tüdőkárosodást okoznak a beteg aluszékonnyá válhat, de kóma ritkán fordul elő. Klórgáz belégzése esetén légmell előfordult már. A gázok kismértékű belégzése kezelést nem igényel.

Ha Ön bármilyen egyéb mellékhatást tapasztalna, amely nem szerepel ebben a tájékoztatóban, forduljon kezelőorvosához.

Mi történik, ha véletlenül lenyeli a tablettát?

A lenyelt tablettából a gyomorsósav hatására klórgáz keletkezik, amely mérgezést okoz! Nagy adag bevétele gége-duzzanatot, tüdővízenyőt és ritkán a keringés összeomlását is eredményezheti. Lenyelését követően a tápcsatornában általában jelentős maró hatás érvényesül, melyet szűkület kialakulása követhet. Gyakori a hányás a hipoklorit lenyelését vagy klóramin vagy klórgáz belégzését követően. Nagy mennyiségű lenyelése esetén vérhányás előfordulhat. Nagy mennyiségű tablettá lenyelése vagy belégzése életveszélyes is lehet, ezért azonnal forduljon orvoshoz!

Milyen csomagolásban kapható a NEOMAGNOL tablettát?

10 db illetve 150 db tablettát.

Hogyan kell tárolni és mennyi ideig használható fel a NEOMAGNOL tablettát?

Legfeljebb 25 °C-on, száraz helyen tartandó.

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó.

OGYI-T- 11705/01-02

AGY-036-2/3

Betegtájékoztató OGYI-eng. száma:30039/55/2003