

Mielőtt elkezdene gyógyszerét alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót. Ez a gyógyszer vény nélkül kapható. Az optimális hatás érdekében azonban elengedhetetlen a gyógyszer körültekintő alkalmazása,

- Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.
- További információkért vagy tanácsért forduljon gyógyszerészéhez.
- Sürgősen keresse fel orvosát, ha tünetei 1-2 héten belül nem enyhülnek vagy éppen súlyosbodnak.

### **A betegtájékoztató tartalma:**

1. Milyen betegségek esetén alkalmazható és hogyan fejt ki hatását a Hemorid végbélkenőcs?
2. Tudnivalók a Hemorid végbélkenőcs alkalmazása előtt
3. Hogyan kell alkalmazni a Hemorid végbélkenőcsöt?
4. Lehetséges mellékhatások
5. Tárolás

**Hatóanyag:** 28,93 mg ephedrin hydrochloridum (efedrin-hidroklorid), 28,85mg procaini hydrochloridum (prokain-hidroklorid), 16,5 mg mentholum (mentol), 16,0 mg D-camphora (D-kámfor), 0,03 mg aetheroleum millefolii (cickafarkolaj)

**Segédanyagok:** 96%-os etanol, gyapjúviasz, sárga vazelin

**Gyógyszerforma:** Sárga színű jellegzetes kámfor és mentol illatú homogén kenőcs, külsőleges alkalmazásra, helyi kezelésre.

### **Gyártó és a forgalomba hozatali engedély jogosultja:**

WAGNER-PHARMA Gyógyszerfejlesztő Gyártó és Forgalmazó Kft.  
1041 Budapest, Kassai u. 56-58/B.

## **1. MILYEN BETEGSÉGEK ESETÉN ALKALMAZHATÓ ÉS HOGYAN FEJTI KI HATÁSÁT A HEMORID VÉGBÉLKENŐCS?**

Aranyeres panaszok tüneti kezelésére, a vérzés, fájdalom, viszketés enyhítésére, a gyulladás csökkentésére szolgáló gyógyszer.

## **2. TUDNIVALÓK A HEMORID VÉGBÉLKENŐCS ALKALMAZÁSA ELŐTT**

### **Ne alkalmazza a végbélkenőcsöt**

- ha a készítmény bármely hatóanyagával szemben túlérzékenység, allergiás reakció, csalánkiütés korábban előfordult,
- ha a kenőcs fájdalmas irritációt vált ki, kérjen orvosi segítséget.

## Terhesség, szoptatás

Terhesség ill. szoptatás ideje alatt a gyógyszer helyi alkalmazása nem jelent veszélyt az Ön és gyermeke egészségére, azonban minden esetben szigorúan tartsa be kezelőorvosa utasításait!

### 3. HOGYAN KELL ALKALMAZNI A HEMORID VÉGBÉLKENŐCSÖT?

Amennyiben kezelőorvosa másképp nem rendeli, szokásos adagja: naponta 3-4-szer babnyi kenőccsel a végbélnyílás környékét kíméletesen bekenni.

**Ha nem tudja hogyan használja a készítményt minden esetben kérdezze meg orvosát vagy gyógyszerészét!**

**Soha ne alkalmazza a készítményt naponta többször, mint az előírt adag!**

### 4. LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK

Mint minden gyógyszernek, a Hemorid végbélkenőcsnek is lehetnek mellékhatásai.

Ha az alábbi tünetek bármelyikét észleli, a kenőcs alkalmazását hagyja abba, azonnal értesítse orvosát vagy jelentkezzen a legközelebbi kórház ügyeleten.

Néhányan allergiások lehetnek a hatóanyagok valamelyikére. A kenőcs használatát követő tünetek a következők lehetnek: kiütés, csalánkiütés, viszketés, a bőrön megjelenő apró piros pöttyök, láz, kidagadó bőrerek, esetleg fekélyes, sebes bőrfelületek. E tüneteket kísérheti hányinger, fejfájás. Ezek nagyon súlyos mellékhatások.

Ha a fenti tünetek bármelyikét tapasztalja, Önnek súlyos allergiás reakciója lehet a készítménnyel szemben és sürgős orvosi segítségre, esetleg kórházi ellátásra lehet szüksége. E rendkívül súlyos mellékhatások rendkívül ritkák.

**Mielőbb értesítse orvosát, ha a következő tünetek bármelyikét észleli.**

- A végbélkenőcs használata idején fájdalmas bőrirritáció léphet fel az alkalmazás helyén.
- Ha bármi kérdése van ezzel kapcsolatban forduljon orvosához.

**HA BÁRMILYEN, A FENTIEKBEN NEM EMLÍTETT MELLÉKHATÁST ÉSZLEL, ÉRTESÍTSE ORVOSÁT VAGY GYÓGYSZERÉSZÉT.**

### 5. TÁROLÁS

Szobahőmérsékleten, 25°C alatt tárolandó.

A gyógyszert csak a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni.

Ne alkalmazza a készítményt, ha színeben, szagában változást észlel.

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!

OGYI-T- 690/01

A beteg tájékoztató engedélyezésének dátuma: 2008. május 7.

Cikkszám: 0020

GS: 03

Méret: 103x145