

Mielőtt elkezdené gyógyszerét alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót.

E recept nélkül kapható gyógyszerrel Ön enyhe, múltó panaszokat kezelhet orvosi felügyelet nélkül. Az optimális hatás érdekében azonban, elengedhetetlen e gyógyszer körütekintő, szakszerű alkalmazása.

- Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.
- További kérdéseivel forduljon gyógyszerészéhez.
- Sürgősen keresse fel orvosát, ha tünetei 3 napon belül nem enyhülnek vagy éppen súlyosbodnának.

Összetétel:

Hatóanyag: 0,05 g oxitetraciklin 1 g porban.

Segédanyagok: Metil-parahidroxibenzoát, laktóz-monohidrát.

Gyógyszerforma: Hintőpor: csaknem fehér vagy világosbarna, finom, homogén por.

Mit kell tudnia gyógyszeréről és az alkalmazás javallatairól ?

Széles spektrumú, antibiotikum tartalmú sebhintőpor, oxitetraciklinre érzékeny kórokozók által okozott felületeseb fertőzések kezelésére.

A sebhintőpor hatóanyaga túlérzékenységi reakciót okozhat, bár helyi alkalmazás mellett ez nem valószínű!

Mikor ne alkalmazza a sebhintőport ?

- ha a készítmény hatóanyagával vagy más tetraciklin származékkal, illetve a készítmény bármely más összetevőjével szemben túlérzékenység, allergiás reakció, csalánkiütés korábban előfordult.
- ha a hintőpor fájdalmas irritációt, gyulladást vált ki. Ha ilyen tünetet észlel, azonnal kérjen orvosi segítséget.
- mély sebeket a por elzárhatja a levegő oxigénjétől, így bizonyos kórokozók elszaporodhatnak.

Mire kell figyelnie a gyógyszer alkalmazása előtt ?

Ha Ön terhes vagy gyermekét szoptatja, az oxitetraciklin sebhintőpor formában történő, helyi alkalmazása nem jelent veszélyt Ön és gyermeke egészségére.

Minden esetben szigorúan tartsa be kezelőorvosa utasításait!

Jelenleg, illetve a közelmúltban szedett receptköteles, vagy vény nélkül kiváltható gyógyszereiről tájékoztassa orvosát vagy gyógyszerészét.

Milyen gyakorlati tudnivalók fontosak az Ön számára az alkalmazás során ?

A Tetrán sebhintőpor alkalmazási gyakoriságát és a kezelés idejét kezelőorvosa szabja meg, a fertőzés típusától és súlyosságától függően. Általában naponta 1-2-szer a fertőzött terület megtisztítása, a pörkös felrakódások eltávolítása után az egész sebfelületet vékony rétegen behinteni.

Ha nem tudja hogyan használja a készítményt, minden esetben kérdezze meg orvosát vagy gyógyszerészét!

Tetrán sebhintőpor

Addig, és csak addig használja a szert, amíg orvosa tanácsolja. Korán abbahagyott antibiotikus kúra a tünetek visszatérését eredményezheti. Ha elfelejti gyógyszerét használni, ahogy eszébe jut, folytassa az előírt módon.

Soha ne alkalmazza a készítményt naponta többször, mint az előírt adag!

Mikor forduljon orvoshoz ?

Minden esetben, ha korábban ismeretlen tünetet észlel a készítmény alkalmazása során /lásd „Lehetséges mellékhatások” leírásban/

Milyen mellékhatások fordulhatnak elő ?

Mint minden gyógyszernek, a Tetran sebhintőporok is lehetnek mellékhatásai

Ha az alábbi tünetek bármelyikét észleli, a Tetran sebhintőpor alkalmazását hagyja abba, azonnal értesítse orvosát vagy jelentkezzen a legközelebbi kórház ügyeletén.

Néhányan allergiások lehetnek az oxitetraciklinre. A sebhintőpor használatát követő tünetek a következők lehetnek: kiütés, csalánkiütés, viszketés, a bőrön megjelenő apró piros pöttyök, kidagadó felszínes bőr alatti erek, esetleg fekélyes, sebes bőrfelületek.

E tüneteket kísérheti hányinger, fejfájás.

Ezek nagyon súlyos mellékhatások. Ha a fenti tünetek bármelyikét tapasztalja, Önnek súlyos allergiás reakciója lehet a készítménnyel szemben és sürgős orvosi segítségre, esetleg kórházi ellátásra lehet szüksége.

E rendkívül súlyos mellékhatások rendkívül ritkák.

Mielőbb értesítse orvosát, ha a következő tünetek bármelyikét észleli.

A sebhintőpor használata idején fájdalmas, gyulladós tünetek léphetnek fel az alkalmazás helyén. Ennek oka allergia, irritáció vagy az antibiotikumok használatakor előforduló ellenálló baktériumok, vagy gombák túlnövekedése lehet. Ha bármilyen kérdése van ezzel kapcsolatban, forduljon orvosához.

Ezek mind enyhe mellékhatások, melyek előfordulása ritka.

Ha bármilyen, a fentiekben nem említett mellékhatást észlel, értesítse orvosát vagy gyógyszerészét.

Hogyan tárolja gyógyszerét ?

Legfeljebb 25 °C-on, fénytől és nedvességtől védve tartandó.

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!

A gyógyszert a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni.

Ne alkalmazza a készítményt, ha színében, szagában változást észlel.

Ne feledje! Ez az Ön gyógyszere. Senki másnak NE adjon belőle, még akkor sem, ha hasonló tünetei vannak!

A forgalombahozatali engedély jogosultja:

WAGNER-PHARMA KFT.

H-1041 Budapest, Kassai u. 56-58/B

Gyártó:

WAGNER-PHARMA KFT.

H-1041 Budapest, Kassai u. 56-58/B

OGYI-T-3103/01-02

Betegtájékoztató OGYI-eng. száma: 29218/41/04

Cikkszám: 0004

GS:02

Méret: 103 x 145