

Magnesium Pharmavit 250 mg pezsgőtabletta

Mielőtt elkezdené gyógyszerét alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót.

- Ez a gyógyszer orvosi vény/rendelvény nélkül kapható. Az optimális hatás érdekében azonban elengedhetetlen e gyógyszer körültekintő és szakszerű alkalmazása.
- Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.
- További kérdéseivel forduljon orvosához, gyógyszerészéhez.

A betegtájékoztató tartalma:

1. Milyen betegségek esetén alkalmazható és hogyan fejt ki hatását a Magnesium Pharmavit 250 mg pezsgőtabletta?
2. Tudnivalók a Magnesium Pharmavit 250 mg pezsgőtabletta alkalmazása előtt
3. Hogyan kell alkalmazni a Magnesium Pharmavit 250 mg pezsgőtablettát?
4. Lehetséges mellékhatások
5. Tárolás
6. További információk

Milyen hatóanyagot és segédanyagokat tartalmaz a pezsgőtabletta?

Hatóanyag: 420 mg magnézium-oxid, 150 mg aszkorbinsav pezsgőtablettánként.

Segédanyagok: málna piros színezék (Amarant 123 és Ponceau 4R E 124), kukoricakeményítő, szacharimid-nátrium, eperaroma, szacharóz, makrogol 6000, nátrium-hidrogén-karbonát, vízmentes citromsav.

1. Milyen betegségek esetén alkalmazható a Magnesium Pharmavit 250 mg pezsgőtabletta?

Magnéziumhiány megelőzésére és kezelésére.

2. Tudnivalók a Magnesium Pharmavit 250 mg pezsgőtabletta alkalmazása előtt

Milyen esetekben nem használható a készítmény?

A készítmény bármely összetevőjével szembeni túlérzékenység. Veseelégtelenség.

Szedhető-e a készítmény terhesség és szoptatás ideje alatt?

Terhesség és szoptatás ideje alatt a megnövekedett magnézium igény pótlására alkalmas.

Befolyásolja-e a készítmény a járművezetői és gépkézeloői képességeket?

Nem befolyásolja a készítmény ezen képességeket.

Mi a teendő túladagolás esetén?

Tünetek: hányás, vérnyomásesés, lassú szívümmködés jelentkezhet.

Túladagolás esetén értesítse kezelőorvosát, mivel orvosi segítségre lehet szüksége.

Szedhet-e egyéb gyógyszert a pezsgőtablettával egyidőben?

Magnézium: egyes gyógyszerek pl. az ún. tetraciklinek (antibiotikumok), biszfoszfonátok, digitális glikozidok (szív-gyógyszerek) felszívódását gátolhatja, ezért e gyógyszerek és a készítmény bevétele között legalább 3 óra különbség szükséges.

- Un. kálium-spóroló vízajtók hosszan tartó alkalmazásánál a magnézium fokozott visszatartásához, és ez a vér magnézium-szintjének megnövekedéséhez vezethet, különösen veseelégtelenségben szenvedő beteg esetében.
- Aszkorbinsav: nagy dóziszú aszkorbinsav csökkenti a vizelet pH-ját, ami a savas jellegű hatóanyagok visszaszívódását fokozza, míg a lúgos jellegűekét csökkenti.

- Cellulóz-nátrium-foszfát és aszkorbinsav egyidejű alkalmazása az aszkorbinsav oxalát-metabolizmusát indukálhatja.
- Deszferoxamin hatóanyagú gyógyszer és aszkorbinsav egyidejű alkalmazásakor a szövetek vas-érzékenysége fokozódik, főként a szívben, ami a szív munkaképességét csökkentheti, keringés összeomlást okozhat. Ezért idős korban a C-vitamint szükség szerint, de csökkentett dózisban kell alkalmazni.
- Diszulfiram hatóanyagú gyógyszer és főként nagy dózisu vagy tartósan szedett aszkorbinsav egyidejű alkalmazása diszulfiram-alkohol jellegű reakciót okozhat.

Az aszkorbinsav megváltoztathatja bizonyos laboratóriumi vizsgálatok eredményeit, szedését néhány nappal a laboratóriumi vizsgálatok elvégzése előtt fel kell függeszteni.

Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét a jelenleg vagy nemrégiben szedett egyéb gyógyszereiről, beleértve a vény nélkül kapható gyógyszereket is.

3. Hogyan kell alkalmazni a Magnesium Pharmavit 250 mg pezsgőtablettát?

0-3 éves kor: 1/4 tablettá.

4-10 éves kor: 1/2 tablettá.

Serdülőknek és felnőtteknek: naponta 1 tablettá.

Orvosi javaslatra ennél nagyobb adagok is szedhetők.

A magnézium pótlás szükséges lehet megnövekedett igény (terhesség, szoptatás), csökkent bevitel (alkoholizmus, malnutritio), felszívódási zavarok (bélbetegségek), jelentős magnéziumvesztés (hányás, hasmenés, égési sérülések, fokozott vizeletürítés okozta káliumhiányos állapotok, vesebetegségek, a veseműködésre károsan ható gyógyszerek alkalmazása), pajzsmirigy alulműködése, Cushing-kór, Crohn-szindróma, fokozott izom-ideg ingerlékenység, izomgörcsök, Ca-oxalátkő képződés esetén.

A pezsgőtablettát egy pohár vízben kell feloldani.

4. Lehetséges mellékhatások

Gyomor-bélrendszer irritációja, vizes hasmenés. Ha az itt felsorolt nemkívánatos hatásokon kívül egyéb szokatlan tünetet észlel, értesítse orvosát vagy gyógyszerészét.

5. Tárolás

25 °C alatti hőmérsékleten, fénytől és nedvességtől védve, az eredeti csomagolásban.

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!

A gyógyszert csak a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni.

6. További információk

A forgalombahozatali engedély jogosultja és gyártó:

WALMARK, a.s.

Oldřichovice 44, 739 61 Třinec, Csehország

A készítményhez kapcsolódó további kérdéseivel forduljon a forgalombahozatali engedély jogosultjához.

OGYI-T-3824/01

A betegtájékoztató engedélyezésének dátuma: 2008. október 7.