

Vevőtájékoztató

GINGISOL

kamilla kivonatot és szegfűszeg olajat tartalmazó
FOGÍNY ÉS SZÁJÁPOLÓ OLDAT – 10 ml

Az optimális hatás érdekében azonban elengedhetetlen a készítmény körültekintő, előírás szerű alkalmazása. Tartsa meg ezt a tájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.

Hatására vonatkozó adatok: a készítmény a szájnyálkahártya és a fogíny ápolására alkalmas. A készítményben található hatóanyagok (kamilla, mentol, szegfűszeg) – a népi gyógyászatban – gyulladáscsökkentő, hűsítő, összehúzó és fertőtlenítő hatásukról ismertek.

Mi a hatóanyaga?

Egy kiszerelés egységre (10 ml) vonatkozóan: 3,9 gr kamilla kivonat (*Chamomillae tinctura*), 0,39 gr szegfűszegolaj (*Caryophylli aetheroleum*)

Mit tartalmaz még a készítmény?

Egy kiszerelés egységre (10 ml) vonatkozóan: 3,76 gr glicerin, 1,9 gr alkohol (min. 38 v/v%), 0,02 gr vanilin, 0,016 gr mentol (*Mentholum racemicum*), 0,014 gr kámfor (*Camphora racemicum*)

Mikor ajánlott a készítmény alkalmazása?

Bármilyen okból kialakuló fogíny problémák (pl. protézis, híd, korona okozta feltörés, irritáció), valamint a száj nyálkahártya ápolására használható.

Mikor nem szabad a készítményt alkalmazni?

Amennyiben nem ismeri a problémák okát, ill. nyílt vérző fogíny és szájnyálkahártya esetén ne alkalmazza a készítményt.

Alkalmazható-e a készítmény gyermekeknél?

Gyermekeknél 3 éves kortól alkalmazható.

Alkalmazható-e a készítmény más készítményekkel együtt?

Egyéb, más a fogíny és a szájnyálkahártya helyi kezelésére alkalmas szerrel együtt ne alkalmazza.

Mit kell megfontolni a terhesség és a szoptatás alatt?
Ezen élethelyzetekben a készítmény alkalmazására vonatkozóan tiltás nem ismert, ha csak Önnek nincs egyéni túlérzékenysége a készítmény összetevőivel szemben. A terhesség első trimeszterében lehetőleg ne alkalmazza.

Hogyan és mikor kell a készítményt alkalmaznia?
Kis méretű (pl. fogpiszkálóra tekert) vattatampont nedvesítsen át az oldattal (3-4 csepp) és az érintett területeket naponta 2-4 alkalommal kenje be. A készítményt mindig fogmosás és azt követő alapos öblítés után használja. A készítmény fogelszíneződést nem okoz.

Milyen nem kívánt hatást válthat ki a készítmény?
Érzékeny egyéneknél túlérzékenységi reakció (pl: bőrpír, égő-viszkető érzés stb.) előfordulhat. Hosszan tartó alkalmazása során a készítmény kámfor tartalma a szájnyálkahártyáján elváltozást okozhat.

Mire kell ügyelnie a készítmény alkalmazása során?

- Alkalmazását mindig fogmosás után és alapos öblítés után végezze és lehetőleg ½-2 óra elteltével fogyasszon ételt, italt.
- Nyílt-, vérző sebre ne alkalmazza a készítményt!
- Gyermekeknél felnőtt felügyelete mellett alkalmazza.

Mennyi ideig alkalmazható a készítmény?
Gyermekeknél fogzás idején alkalomszerűen. Felnőtteknél a fogíny problémák megszűnéséig, de legfeljebb egy hétig.

Hogyan tárolja a készítményt?
Száras helyen, szobahőmérsékleten (15-25°C) tárolandó. Gyermekek elől gondosan elzárandó!

Gyártja és forgalmazza:
MediLine Üzletház Kft.
1139, Budapest Csizma u.4.
(36 1) 239 1828, [www.mediline .hu](http://www.mediline.hu)

Nyilvántartási szám: OÉTI 3245/2007