

BETEGTÁJÉKOZTATÓ

Mielőtt elkezdene a gyógyhatású készítményt alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót.

E recept nélkül kapható gyógyhatású szert Ön orvosi felügyelet nélkül alkalmazhatja. Az optimális hatás érdekében azonban, elengedhetetlen a készítmény körültekintő, előírás-szerű alkalmazása.

Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.

EPASEL kapszula

(Sinnex Zrt.)

A szív és keringési rendszer megbetegedéseinek veszélye esetén, a szívinfarktus kialakulásának megelőzésére szolgáló gyógyszerek nem minősülő gyógyhatású készítmény, melynek hatását szakirodalmi adatok és állatkísérleti eredmények igazolják.

Milyen hatás várható el a kapszulától?

Az Epasel kapszula élettanilag fontos, halolajból származó telítetlen zsírsavakat és szelént tartalmaz, melyek átlagos táplálkozásunkkal nem kerülnek kellő mennyiségben szervezetünkbe.

A kapszula kúraszerű alkalmazása során:

- csökkenti a vér koleszterinszintjét,
- segíti a vérerek egészséges arányának helyreállítását,
- növeli az érfalak rugalmasságát,
- lassítja az életkorral járó érlelmeszesedési folyamatokat,
- gátolja a vérlemezkék összetapadását,
- csökkenti a trombózis kialakulásának veszélyét.

Mi a hatóanyag?

kapszulánként 500 mg tengeri halolaj [Pisci oleum (18% eikozapentaénsav /EPA/, 12% dokozahexaénsav /DHA/)], 25 µg szelént tartalmazó élesztőpor

Mit tartalmaz még a készítmény?

Segédanyagok: glicerín-monosztearát, zselatin, glicerín, szorbit, titándioxid (E171), sárga vasoxid (E172), fekete vasoxid (E172) és patent kék (E131) festékanyagok, valamint víz.

Mikor ajánlott a kapszula szedése?

A szív és a keringési rendszer megbetegedéseinek veszélye esetén, a szívinfarktus kialakulásának megelőzésére.

Mikor nem ajánlott a készítmény alkalmazása?

Amennyiben Ön vérzékenységben, vérzési rendellenességben vagy súlyos májbetegségben szenved, vagy várandós, a készítmény alkalmazása nem ajánlott.

Mit kell tudni az alkalmazás megkezdése előtt?

Az Epasel kapszulával egyidejűleg más szelén tartalmú készítményt ne alkalmazzon!

Szedhetik-e a kapszulát gyermekek?

Összetétele és alkalmazási javaslata alapján a kapszula szedése gyermekeknek nem indokolt és így nem ajánlott.

Szedhető-e a készítmény más gyógyszerekkel?

Szív- és érrendszeri betegségben rendszeresen gyógyszert szedők, illetve véralvadásra ható gyógyszerre beállított betegek a készítmény kúraszerű alkalmazásáról kérjék ki szakember véleményét.

Várandósság és szoptatás ideje alatt szedhető-e a kapszula?

A kapszula biztonságos alkalmazására vonatkozóan nem állnak rendelkezésre adatok ezen élethelyzetekben, ezért szedése nem javasolt.

Milyen adagolásban és hogyan kell a kapszulát bevenni?

Naponta 2 x 2 kapszulát ajánlott étkezések alkalmával bevenni hideg vagy langyos folyadékkal. Ajánlatos a kapszulát rövid idő (pillanatok) alatt bőséges folyadékkal lenyelni és nem célszerű szájbán tartogatni, mivel a zselatin duzzadása miatt a kapszulahéj hirtelen ragadóssá válhat, ennek következtében a lenyelés nehézkes lehet.

Milyen nem kívánt hatást válthat ki a készítmény?

A kapszula előírászerű alkalmazása során ezidáig mellékhatások nem ismeretesek. Extrém nagy adagok alkalmazása esetén esetleg szelén túladagolás következtében fellépő hajhullás előfordulhat. A kapszula bármely alkotórészével szembeni egyéni túlérzékenységi (emésztőrendszeri) panaszok, bőrtünetek, előfordulhatnak.

Mire kell még ügyelni a készítmény alkalmazása során?

A készítményt gyermekek elől el kell zárni!

Mennyi ideig szedhető a készítmény?

A kapszula kúraszerű (2-3 hónapig tartó) alkalmazása javasolt. 2-3 hónap után célszerű a vér paramétereit ellenőriztetni, és annak eredményétől függően folytatni a kúrát.

Hogyan kell tárolni a készítményt?

Legfeljebb 25° C-on tartandó.

Csomagolási egység: 60 db/doboz

Nyilvántartási szám: OGYI -147/1990

Forgalomba hozatali engedély jogosultja: Sinnex Zrt.

1037 Budapest, Montevideo u. 3/A