

BETEGTÁJÉKOZTATÓ

Mielőtt elkezdené a gyógyhatású készítményt alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót.

E recept nélkül kapható gyógyhatású szerrel Ön enyhe, múló panaszokat kezelhet orvosi felügyelet nélkül. Az optimális hatás érdekében azonban, elengedhetetlen a készítmény körültekintő, előírás szerű alkalmazása.

Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.

EGAVER

Külsőleges oldat

Ifjúkori szemölcs kezelésére orvosilag alkalmasnak talált, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény.

Mi a hatóanyaga?

1 g almasav (*Acidum malicum*) és 1 g citromsav (*Acidum citricum monohydricum*) 10 ml vizes oldatban.

Mit tartalmaz még a készítmény?

Segédanyagként nátrium-tetraborátot, metilcellulózt és tisztított vizet tartalmaz.

Mikor ajánlott a készítmény alkalmazása?

A kézen, lábfejen, térden vagy arcon megjelenő és gyorsan szaporodó érdes felszínű, kemény tapintású, bőrszínű, fényes, lapos formában megjelenő hámváltozások, azaz szemölcsök kezelésére. Különösen alkalmas – az elsősorban uszodai fertőzés során kialakuló – ifjúkori szemölcsök (*verruca plana juvenilis*) kezelésére.

Mikor nem szabad az Egavert alkalmazni?

Anyajegy vagy nem bizonyítottan vírus okozta szemölcs eredetű növedék esetén.

Mit kell tudni az alkalmazás megkezdése előtt?

Ha bizonytalan bőrelváltozásának szemölcs jellegében, az alkalmazása előtt kérje ki orvosa tanácsát.

Használhatják-e gyermekek a készítményt?

A készítmény alkalmazható gyermekeknél is, sőt kifejezetten az ún. ifjúkori szemölcs kezelésére ajánlott.

Mit kell megfontolni várandósság és szoptatás ideje alatt?

Ezen élethelyzetekben történő alkalmazásra vonatkozó ellenjavallat nem ismert.

Hogyan és milyen módon kell a készítményt alkalmazni?

A megtisztított, majd megszáritott beteg bőrfelületet pálcikára csavart vattára cseppentett oldattal naponta kétszer bekenni.

Milyen nem kívánt hatásokat válthat ki a készítmény?

Előírászerű alkalmazás során, ez idáig nem kívánt hatásokat nem tapasztaltak.

Mire kell még ügyelnie a készítmény alkalmazása során?

Az Egaver ép bőrfelületre és nyílt vérző sebre ne kerüljön!
Szem és száj környékén óvatosan használandó!

Mennyi ideig alkalmazható a készítmény?

A szemölcs nagyságától függően 3-6 hétig. A szemölcsök kiújulása esetén a kúra megismételhető.

Hogyan kell tárolni a készítményt?

Legfeljebb 25° C-on, jól lezárva.
Gyermekektől elzárva tartandó!

Csomagolási egység: 10 ml

Nyilvántartási szám: OGYI-011/1986

Forgalomba hozatali engedély jogosultja: Sinnex Zrt.

1037 Budapest, Montevideo u. 3/A