

# Bepanthen®

## Kenőcs

dexpantenol



Olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mely az Ön számára fontos információkat tartalmaz.

Ez a gyógyszer orvosi rendelvény nélkül kapható. Mindemellett az optimális hatás érdekében elengedhetetlen a gyógyszer körültekintő, szakszerű alkalmazása.

- Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.
- További információért vagy tanácsért forduljon gyógyszerészéhez.
- Sürgősen forduljon orvosához, ha tünetei 3 napon belül nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.
- Ha bármely mellékhatás súlyossá válik, vagy ha a betegtájékoztatóban felsorolt mellékhatásokon kívül egyéb tünetet észlel, kérjük, értesítse orvosát vagy gyógyszerészét.

### A betegtájékoztató tartalma:

1. Milyen típusú gyógyszer a BEPANTHEN kenőcs és milyen betegségek esetén alkalmazható?
2. Tudnivalók a BEPANTHEN kenőcs alkalmazása előtt
3. Hogyan kell alkalmazni a BEPANTHEN kenőcsöt?
4. Lehetséges mellékhatások
5. Hogyan kell a BEPANTHEN kenőcsöt tárolni?
6. További információk

### 1. MILYEN TÍPUSÚ GYÓGYSZER A BEPANTHEN KENŐCS ÉS MILYEN BETEGSÉGEK ESETÉN ALKALMAZHATÓ?

A Bepanthen kenőcs bőrvédő, bőrgyógyító kenőcs. Hatóanyaga a dexpantenol, mely a bőr sejtjeiben gyorsan pantoténsav nevű vitaminná alakul át. A pantoténsav szerepet játszik mind a bőr felépítésében, mind újraképződésében. A hatóanyagot (dexpantenolt) zsíros kenőcs alapanyagban tartalmazza.

#### Alkalmazása javasolt:

- Sebgyógyulás és hámosodás elősegítésére kisebb sérülések (banális égések és horzsolások), bőrirritáció (például radioterápia, fototerápia vagy UV fény expozíció után) esetén.
- Kiegészítő kezelésként krónikus fekélyesedések és felfekvési seb, végbélnyílás körüli berepedések, bőrátültetés és a nőgyógyászatban méhnyaksebek esetében.
- Rendszeres használatlalt a bőr szárazságának, berepedezettségének megelőzésére, védelmére, ill. kezelésére szolgál.
- Szoptatás alatt a mell rendszeres ápolására és a sebes vagy berepedezett mellbimbó kezelésére.
- Csecsemő ápolásakor a nedves pelenka okozta gyulladások, kidörzsölődések, bőrpír, valamint kiütések megelőzésére, kezelésére.
- Kortikoszteroid-kezelés kiegészítőjeként, vagy azt követő kezelésre.

### 2. TUDNIVALÓK A BEPANTHEN KENŐCS ALKALMAZÁSA ELŐTT

#### Ne alkalmazza a Bepanthen kenőcsöt

- ha túlérzékeny a készítmény hatóanyagára vagy a Bepanthen kenőcs egyéb összetevőjére (hatóanyagokat, összetevőket ld. 6. pontban).

#### A Bepanthen kenőcs fokozott elővigyázatossággal alkalmazható, ha Ön:

- allergiás valamire,
  - más egyéb betegsége is van,
  - egyéb gyógyszert is szed vagy használ (a nem vényköteleseket is beleértve).
- Ilyenkor kérje ki orvosa tanácsát.

#### Terhesség, szoptatás

Bepanthen kenőcs használható terhesség idején és szoptatás alatt.

Mielőtt bármilyen gyógyszert elkezdene szedni, beszélje meg kezelőorvosával vagy gyógyszerészével.

### 3. HOGYAN KELL ALKALMAZNI A BEPANTHEN KENŐCSÖT?

Szükség szerint naponta egyszer vagy többször, külsőleg, az érintett, megtisztított bőrfelületre kell kenni. Amennyiben nem biztos az adagolást illetően, kérdezze meg orvosát vagy gyógyszerészét.

#### **Hogyan kell alkalmazni szoptató kismamáknak mellbimbó ápolásakor?**

Minden szoptatás után öblítse le, törölje szárazra és kenje be a mellbimbót.

#### **Hogyan kell alkalmazni csecsemők ápolásakor?**

Minden tisztába tevéskor, miután vízzel lemosta és megszáritotta a baba fenekét és ágyékát, kenje be az érintett területet.

Ha tünetei néhány napon belül nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak, sürgősen forduljon orvosához.

Ha bármilyen további kérdése van a készítmény alkalmazásával kapcsolatban, kérdezze meg orvosát vagy gyógyszerészét.

### 4. LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK

Mint minden gyógyszer, így a Bepanthen kenőcs is okozhat mellékhatásokat, amelyek azonban nem mindenkinél jelentkeznek. A Bepanthen kenőcs használatakor ritkán előfordulhatnak átmeneti allergiaszerű bőrtünetek. Ha ezek a mellékhatások súlyossá válnak, vagy ha a betegtájékoztatóban említett mellékhatásokon kívül egyéb tünetet észlel, pl. szokatlan bőrelváltozást, kérjük, értesítse orvosát vagy gyógyszerészét.

### 5. HOGYAN KELL TÁROLNI A BEPANTHEN KENŐCSÖT?

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó.

Használat után jól zárja le a tubust.

Legfeljebb 25°C-on tárolandó.

A dobozon, tubuson feltüntetett lejárati idő (Felhasználható:) után ne alkalmazza a Bepanthen kenőcsöt. A lejárati idő a megadott hónap utolsó napjára vonatkozik.

A gyógyszereket nem szabad a szennyvízzel vagy a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. Kérdezze meg gyógyszerészét, hogy szükségtelessé vált gyógyszereit miként semmisítse meg. Ezek az intézkedések elősegítik a környezet védelmét.

### 6. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

#### **Mit tartalmaz a Bepanthen kenőcs?**

A készítmény hatóanyaga: 50,0 mg dexpanthenol 1 g kenőcsben. Egyéb összetevők: sztearil-alkohol, cetil-alkohol, fehér viasz, mandula olaj, „Protegin X”, fehér vazelin, folyékony paraffin, gyapjúviasz, tisztított víz.

#### **Milyen a készítmény külleme és mit tartalmaz a csomagolás**

Krémszínű, homogén kenőcs gyapjúviasz szaggal.

3,5 g vagy 30 g vagy 100 g kenőcs csavaros műanyag kupakkal lezárt lakkozott alumínium tubusba töltve. A tubus kartondobozban található.

#### **A forgalomba hozatali engedély jogosultja és a gyártó**

A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Bayer Hungária Kft. 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

Gyártó: GP Grenzach Productions GmbH, 79639 Grenzach-Wyhlen, Emil-Barrel Strasse 7. Németország

OGYI-T- 5408/01 Bepanthen kenőcs (30 g)

OGYI-T- 5408/02 Bepanthen kenőcs (3,5 g)

OGYI-T- 5408/03 Bepanthen kenőcs (100 g)

#### **A betegtájékoztató engedélyezésének dátuma**

2008.12.18.