



BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

COLDREX Tabletta

Olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mely az Ön számára fontos információkat tartalmaz.

Ez a gyógyszer orvosi rendelvény nélkül kapható. Mindemelett az optimális hatás érdekében elengedhetetlen a gyógyszer körültekintő alkalmazása.

- Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.
- További információért vagy tanácsért forduljon gyógyszerészéhez.
- Sürgősen forduljon orvosához, ha tünetei egy hét múlva sem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.
- Ha bármely mellékhatás súlyossá válik, vagy ha a betegtájékoztatóban felsorolt mellékhatásokon kívül egyéb tünetet észlel, kérjük, értesítse orvosát vagy gyógyszerészét.

A betegtájékoztató tartalma:

1. Milyen típusú gyógyszer a **Coldrex** tableta és milyen betegségek esetén alkalmazható?
2. Tudnivalók a **Coldrex** tableta szedése előtt.
3. Hogyan kell alkalmazni a **Coldrex** tablettát?
4. Lehetséges mellékhatások
5. Hogyan kell a **Coldrex** tablettát tárolni?
6. További információk

1. MILYEN TÍPUSÚ GYÓGYSZER A COLDREX TABLETTA ÉS MILYEN BETEGSÉGEK ESETÉN ALKALMAZHATÓ?

A **Coldrex** tableta a megfázás és influenza tüneteinek enyhítésére szolgáló gyógyszerkombináció felnőtteknek és gyerekeknek 6 éves kortól.

Több hatóanyag kombinációját tartalmazza, így egyszerre enyhíti a megfázás és az influenza több tünetét:

- **paracetamol**, amely fájdalom- és lázcsillapító hatású,
- **fenilefrin-hidrokloridot**, amely szabadabbá teszi a náthásan eldugult orrot és orrmelléküregeket,
- **koffeint**, amely segít a megfázással járó levertség leküzdésében,
- **terpin-hidrátot**, amely köptető hatású,
- **aszcorbinsavat (C-vitamin)**, amely a megfázás és influenza kapcsán fellépő C-vitamin hiány pótlásában segít.

A különböző panaszok enyhítésére Önnek nem kell több, különféle gyógyszert bevennie, azokat a **Coldrex** tableta egyszerre enyhíti:

- csökkenti a lázat,
- csillapítja a fejfájást és az izomfájdalmakat,
- megszünteti az orrdugulást és segít az orrmelléküregek szabadabb tételében, enyhíti a torokfájást.

2. TUDNIVALÓK A COLDREX TABLETTA SZEDÉSE ELŐTT

A **Coldrex** tableta **paracetamol** és az **orrdugulás csökkentésére szolgáló hatóanyagot** tartalmaz.



Ézért, ne alkalmazza egyéb paracetamol-tartalmú, vagy a megfázás és influenza kezelésére szolgáló más készítményekkel együtt!

Ne szedje a **Coldrex** tablettát

- ha **allergiás** (túlérzékeny) a hatóanyagokra vagy a **Coldrex** tableta egyéb összetevőjére.
- ha **máj-, vagy súlyos vesebetegség** van.
- ha **pajzsmirigy túlműködése** van.
- ha **magasvérnyomás- vagy szívbetegség** van.
- ha **cukorbeteg**.
- ha bizonyos **más gyógyszereket is szed** (további információért lásd „A kezelés ideje alatt alkalmazott egyéb gyógyszerek”).
- egyéb paracetamol-tartalmú, vagy a megfázás és influenza kezelésére szolgáló más készítményekkel együtt.

6 évesnél fiatalabb gyermekeknek csak orvosi utasításra adható.

Beszéljen orvosával, ha a felsoroltak bármelyike igaz Önre.

A **Coldrex** tableta **fokozott elővigyázatossággal alkalmazható**

- **Alkoholos eredetű májbetegség esetén**, mivel fokozott lehet a túladagolás előfordulásának veszélye.

A kezelés ideje alatt alkalmazott egyéb gyógyszerek

- **Ne alkalmazza egyéb paracetamol-tartalmú, vagy a megfázás és influenza kezelésére szolgáló más készítményekkel együtt.**
- **Ne alkalmazza ha depresszió kezelésére** szolgáló gyógyszereket pl. monoaminoxidáz gátló szereket vagy **szívproblémák és magas vérnyomás** kezelésére szolgáló ún. **béta-blokkoló** gyógyszereket szed.

Feltétlenül **tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét** a jelenleg vagy nemrégiben szedett egyéb gyógyszereiről, beleértve a vény nélkül kapható készítményeket is.

Terhesség és szoptatás

Amennyiben Ön terhes vagy szoptat, beszéljen kezelőorvosával mielőtt elkezdené a gyógyszert szedni.

A készítmény hatása a gépjárművezetéshez és gépek üzemeltetéséhez szükséges képességekre

Nincs hatással a gépjárművezetéshez és gépek üzemeltetéséhez szükséges képességekre.



COLDREX Tabletta

Fontos információk a Coldrex tablettára egyes összetevőiről

Segédanyagként Sunset Yellow festéket (E110) tartalmaz, amely allergiás reakciókat okozhat.

3. HOGYAN KELL ALKALMAZNI A COLDREX TABLETTÁT?

Szaján át történő alkalmazására. A tablettákat vízzel nyelje le.

A készítmény szokásos adagja:

Felnőttek és 12 éves vagy annál idősebb gyermekek számára:

4-6 óránként 1-2 tablettát. **24 órán belül legfeljebb 8 tablettát vehető be.**

6-12 éves gyermekek számára:

4-6 óránként 1 tablettát, legfeljebb naponta négyszer. **24 órán belül legfeljebb 4 tablettát vehető be.**

6 évesnél fiatalabb gyermekeknek csak orvosi utasításra adható.

Ne lépje túl az előírt adagot!

Amennyiben nem biztos az adagolást illetően, kérdezze meg orvosát vagy gyógyszerészét.

Egy hétnél tovább ne alkalmazza ezt a gyógyszert!

Kéresse fel kezelőorvosát, ha tünetei egy hét múlva sem enyhülnek és hagyja abba a Coldrex tabletták szedését.

Ha az előírtnál több Coldrex tablettát vett be

Ne vegyen be többet az előírt adagnál! Ha az előírtnál több Coldrex tablettát vett be, forduljon mihamarabb orvoshoz még akkor is, ha nem érzi rosszul magát. Ha valaki túl sok paracetamolot vett be, fennáll a veszéyle egy későbbi májkárosodás kialakulásának.

Ha elfelejtette bevenni a Coldrex tablettát

Ne vegyen be dupla adagot az elfelejtett tablettá pótlására!

4. LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK

Mint minden gyógyszer, így a Coldrex tablettára is okozhat mellékhatásokat, amelyek azonban nem mindenkinél jelentkeznek.

A paracetamol ritkán okoz mellékhatásokat, de néha túlérzékenységi reakciók pl. bőrkiütések előfordulhatnak.

A fenilefrin ritkán okozhat hányingert, hányást, hasmenést, fejfájást, szédülést, vérnyomásemelkedést, álmatlanságot és szívdobogásérzést.

Ezek a mellékhatások általában elmúlnak, amint abbahagyja a készítmény szedését.

Ha bármely mellékhatás súlyossá válik, vagy ha a betegtájékoztatóban felsorolt mellékhatásokon kívül egyéb tünetet észlel, kérjük, **értesítse orvosát vagy gyógyszerészét.**

5. HOGYAN KELL A COLDREX TABLETTÁT TÁROLNI?

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!

Nedvességtől védve tartandó.

A dobozon feltüntetett lejárati idő (Felhasználható:) után ne szedje a **Coldrexet**. A lejárati idő a megadott hónap utolsó napjára vonatkozik.

A gyógyszereket nem szabad a szennyvízzel vagy a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. Kérdezze meg gyógyszerészét, hogy szükségtelemnél vált gyógyszereit miként semmisítse meg. Ezek az intézkedések elősegítik a környezet védelmét.

6. TÖVÁBBI INFORMÁCIÓK

Mit tartalmaz a Coldrex tablettára

A készítmény hatóanyagai a paracetamol, fenilefrin-hidroklorid, koffein, terpin-hidrárt és aszkorbinsav (C-vitamin). Minden tablettára 500 mg paracetamol, 5 mg fenilefrin-hidrokloridot, 25 mg koffeint, 20 mg terpin-hidrárt és 30 mg aszkorbinsavat tartalmaz.

• Egyéb összetevők: kálium-szorbát, nátrium-lauryl-szulfát, povidon, sztearinsav, talkum, hidegduzzadó keményítő, kukoricakeményítő, sunset yellow (E110).

Milyen a készítmény külleme és mit tartalmaz a csomagolás

A tablettára két rétegű, narancssárga/fehér színű, ovális alakú és domború felületű. Egyik oldalán **Coldrex** jelzéssel van ellátva.

Csomagolás: 12 vagy 24 tablettára fehér színű, átlátszatlan PVC/Al burorékfóliában és dobozban.

A forgalomba hozatali engedély jogosultja és a gyártó

A forgalomba hozatali engedély jogosultja: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, GlaxoSmithKline Export Limited, Brentford TW8 9GS, Egyesült Királyság

Gyártó: GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd., Knockbrack, Dungarvan, Írország

A forgalomba hozatali engedély jogosultjának magyarországi képviselője:

GlaxoSmithKline Kft., Consumer Healthcare
1124 Budapest, Csörsz u. 43.

UGY-T-1714/01-02

A betegtájékoztató engedélyezésének dátuma: 2009. március 19.