

Saridon®

paracetamol
propifenazon
koffein

tabletta

Olvassa el figyelmesen az alábbi betegájékoztatót, mely az Ön számára fontos információkat tartalmaz.

Ez a gyógyszer orvosi rendelvény nélkül kapható. Mindemellett az optimális hatás érdekében elengedhetetlen a gyógyszer körültekintő alkalmazása.

- Tartsa meg a betegájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.
- További információkért vagy tanácsért forduljon gyógyszerészéhez.
- Sürgősen forduljon orvosához, ha tünetei egy héten belül nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.
- Ha bármely mellékhatás súlyossá válik, vagy ha a betegájékoztatóban felsorolt mellékhatásokon kívül egyéb tünetet észlel, kérjük, értesítse orvosát vagy gyógyszerészét.

A betegájékoztató tartalma:

1. Milyen típusú gyógyszer a Saridon tableta és milyen betegségek esetén alkalmazható?
2. Tudnivalók a Saridon tableta alkalmazása előtt
3. Hogyan kell szedni a Saridon tablettát?
4. Lehetséges mellékhatások
5. Hogyan kell a Saridon tablettát tárolni?
6. További információk

1. Milyen típusú gyógyszer a Saridon tableta és milyen betegségek esetén alkalmazható?

A Saridon fájdalomcsillapító hatású gyógyszer, amely enyhíti a fájdalmat és csökkenti a lázat. Fejfájás, migrén, fogfájás, menstruációs fájdalom, reumás fájdalom, műtét utáni fájdalom, valamint megfázást és influenzát kísérő fájdalom és láz kezelésére alkalmazható.

2. Tudnivalók a Saridon tableta alkalmazása előtt

Ne alkalmazza a Saridont

- ha allergiás (túlérzékeny) a készítmény hatóanyagaira vagy a Saridon egyéb összetevőjére,
- ha allergiás az ún. pirazonon származékokra (fenilbutazon, fenazon, propifenazon, aminofenazon, metamizol, stb. hatóanyagokra)
- ha súlyos máj- vagy vesebetegségben szenved,
- ha örökletes vérszegénysége van,
- túlzott, illetve krónikus alkoholfogyasztás esetén,
- ha porfirin-anyagcsere zavara (porfíria) van.
- 12 év alatti gyermekeknek.

A Saridon fokozott elővigyázatossággal, orvosával való megbeszélés után alkalmazható

- ha asztmás vagy krónikus csalánkiütése van, továbbá egyéb fájdalomcsillapítóra vagy reuma elleni szerre túlérzékeny,
- ha más betegségben vagy allergiában szenved.

A kezelés ideje alatt alkalmazott egyéb gyógyszerek

Az együtt szedett gyógyszerek egymás hatását befolyásolhatják. Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét a jelenleg vagy nemrégiben szedett egyéb gyógyszereiről, beleértve a vény nélkül kapható készítményeket is.

Csak előzetes orvosi megbeszélés után szedje a Saridon tablettát, amennyiben altatószert, a gyomor ürülési sebességét befolyásoló készítményt, klóramfenikolt, metoklopramidot, véralvadásgátlót, allergia elleni készítményt, vagy fogamzásgátlót szed.

A Saridon egyidejű bevétele bizonyos ételekkel vagy italokkal

A tableta szedése alatt az alkohol fogyasztása kerülendő.

Terhesség és szoptatás

Mielőtt bármilyen gyógyszert elkezdene szedni, beszélje meg kezelőorvosával vagy gyógyszerészéval. Ha terhes vagy szoptat a Saridon tablettát csak orvosa kifejezett utasítására szedheti.

A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és gépek kezeléséhez szükséges képességekre

A Saridon nem, vagy csak elhanyagolható mértékben befolyásolja a gépjárművezetéshez és gépek kezeléséhez szükséges képességeket.

3. HOGYAN KELL SZEDNI A SARIDON TABLETTÁT?

A készítmény szokásos egyszeri adagja felnőtteknek: 1-2 tablettát, 12-16 éveseknek 1 tablettát. Szükség esetén az egyszeri adag 24 órán belül háromszor megismételhető. A tablettát bőséges folyadékkal kell bevenni.

Ne szedje a gyógyszert a betegtájékoztatóban megadottnál nagyobb adagban. Más fájdalomcsillapítókhoz hasonlóan a Saridon tablettát se szedje orvosi utasítás nélkül hosszabb ideig rendszeresen.

Ne felejtse, ha fejfájása kezelésére folyamatosan fájdalomcsillapítót szed, a fejfájás állandósulhat. Ha egy hétnél hosszabb ideje láza vagy fájdalma van, forduljon orvoshoz!

Ha az előírtnál több Saridon vett be:

Túladagolás esetén azonnal keresse fel a legközelebbi kórház sürgősségi osztályát vagy értesítse kezelőorvosát, mivel orvosi segítségre lehet szüksége!

Nagy mennyiségű tablettát bevétele után előfordulhat, hogy akár 2-3 napig nem jelentkeznek a paracetamol-túladagolás tünetei, bár az esetek többségében 24-48 óra alatt észlelni lehet a tüneteket:

hányinger, hányás, étvágytalanság, sápadtság, hasi fájdalom. A túladagolás halálhoz vezető májkómát okozhat!

A koffein túladagolás tünetei: remegés, izgatottság, fülzúgás, ritmuszavarok.

Ha bármilyen további kérdése van a készítmény alkalmazásával kapcsolatban, kérdezze meg orvosát vagy gyógyszerészét.

4. LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK

Mint minden gyógyszer, így a Saridon is okozhat mellékhatásokat, amelyek azonban nem mindenkinél jelentkeznek.

A tablettát szedésekor alkalmanként allergiás reakciók (bőrkütiés, csalánkiütés) jelentkezhetnek. Nagyon ritkán az arra érzékenyeknél légzési problémák (nehézlégzés, asztma) és keringési rendszerrel kapcsolatos reakciók léphetnek fel.

Nagy adagokban (főleg tartós alkalmazás esetén) súlyos, visszafordíthatatlan májkárosodást okozhat. Korai tünetek: étvágytalanság, hányinger, hányás, izzadás, általános gyengeség, rossz közérzet. Nagy adagok tartós alkalmazása a vesefunkció romlását is okozhatja.

Ha bármely mellékhatás súlyossá válik, vagy ha a betegtájékoztatóban felsorolt mellékhatásokon kívül egyéb szokatlan tünetet észlel, kérjük, értesítse orvosát vagy gyógyszerészét.

5. HOGYAN KELL A SARIDON TABLETTÁT TÁROLNI?

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!

A dobozon, buborékfólián feltüntetett lejárati idő (EXP) után ne alkalmazza a Saridon tablettát. A lejárati idő a megadott hónap utolsó napjára vonatkozik.

A gyógyszereket nem szabad a szennyvízzel vagy a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. Kérdezze meg gyógyszerészét, hogy szükségtelenné vált gyógyszereit miként semmisítse meg. Ezek az intézkedések elősegítik a környezet védelmét.

6. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Mit tartalmaz a Saridon tablettát:

A készítmény hatóanyagai: 250 mg paracetamol, 150 mg propifenazon, ill. 50 mg koffein tablettánként.

Egyéb összetevők: vízmentes kolloid szilícium-dioxid, magnézium-sztearát, talkum, hipromellóz, kukoricakeményítő, formaldehid-kazein (Esma Spreng), mikrokristályos cellulóz.

Milyen a készítmény külleme és mit tartalmaz a csomagolás:

A Saridon fehér, illetve csaknem fehér színű, szagtalan korong alakú, lapos felületű, metszett élű, egyik oldalán „Saridon” mélynyomású felirattal, másik oldalán mélynyomású felezővonallal ellátott tablettát.

10 db, ill. 20 db tablettát átlátszatlan PVC/Al buborékfóliában és dobozban.

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

Bayer Hungaria Kft. - 1123 Budapest; Áltókat u. 50.

A gyártó:

Bayer Santé Familiale SAS
33 rue de l'Industrie - F-74240 Gaillard

A betegtájékoztató engedélyezésének dátuma: 2009. január 12.

