

# ACC<sup>®</sup> 100 granulátum

acetilcisztein

Mielőtt elkezdene gyógyszerét alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegájékoztatót!

- E recept nélkül kapható gyógyszerrel Ön enyhe, múltó panaszokat kezelhet orvosi felügyelet nélkül. Az optimális hatás érdekében azonban, elengedhetetlen e gyógyszer körütekintő, szakszerű alkalmazása.
- Tartsa meg a betegájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet!
- További kérdéseivel forduljon gyógyszerészéhez!
- Sürgősen keresse fel orvosát, ha tünetei egy héten belül nem enyhülnek vagy éppen súlyosbodnak!

## Mi az ACC 100 granulátum, és mire szolgál?

Az ACC 100 granulátum, amelynek hatóanyaga az acetilcisztein, a légutakban levő sűrű viszkózus váladék oldására alkalmas. Fokozott viszkózitású nyákelválasztással, köhögéssel járó légúti betegségek váladékoldást elősegítő terápiájában javallt.

Hosszabb ideig kizárólag az orvos utasítására, az orvos által előírt adagban és ideig alkalmazható!

Hatóanyag: 100 mg acetilciszteinum (acetilcisztein) tasakonként.

Segédanyagok: szacharin, aszkorbinsav, narancsaroma, szacharóz.

## Mikor nem szabad az ACC 100 granulátumot szedni?

- Acetilciszteinnel vagy egyéb összetevőkkel szemben fennálló túlérzékenység esetén.
- Csecsemők és 1 éves kor alatti kisgyermekek kezelésére nem szabad alkalmazni (csak kórházban, szigorú orvosi ellenőrzés mellett).
- Terhesség és szoptatás ideje alatt szedése nem javasolt.
- Asztmában, nyelőcsői vénatágulatban, gyomorfekélyben szenvedő betegeknek csak orvosi receptre és orvosi ellenőrzés mellett szabad szedni a gyógyszert.

Amennyiben Ön asztmás, vagy korábban asztmás rohamai voltak, vagy nyelőcsői vénatágulata vagy gyomorfekélye van, az ACC 100 granulátum szedése előtt tájékoztassa betegségéről háziorvosát, mert asztmás betegekben a készítmény fokozhatja az asztmás rohamok veszélyét, nyelőcsői vénatágulat vagy gyomorfekély esetén az acetilcisztein miatti esetleges hányás fokozhatja a vérzés veszélyét.

Forduljon orvosához, ha a fentiekben leírtak valamelyike érinti Önt, vagy bármikor a múltban érintette Önt.

## Mit kell tudnia az egyéb gyógyszerek szedéséről?

- Egyes antibiotikumok hatását az acetilcisztein csökkentheti, ezért biztonsági okokból az antibiotikumokat az ACC-től külön és legalább 2 óra elteltével ajánlott alkalmazni.
- Köhögéscsillapítókkal együtt nem szabad szedni, mivel a köhögési reflex gátlása következtében veszélyes váladékfelhalmozódás alakulhat ki.

Jelenleg, illetve közelmúltban szedett receptköteles vagy recept nélkül kiváltható gyógyszereiről tájékoztassa orvosát vagy a gyógyszerészt!

## Figyelmeztetések

Az ACC 100 granulátum 2,83 g szacharózt (0,24 szénhidrát egység) tartalmaz, amit cukorbetegeknek figyelembe kell venni.

## Hogyan kell alkalmazni az ACC 100 granulátumot?

Az ACC 100 granulátumot evés után kell bevenni.

A granulátumot vízben, gyümölcslemben vagy teában kell feloldani és utána meginni.

Az oldatot a granulátum feloldása után rövid időn belül meg kell inni. Kivételes esetekben az aszkorbinsav (C-vitamin) stabilizáló hatása miatt az ivásra kész oldatot kb. 2 órán át lehet állni hagyni, esetleg meleg folyadékban is. A bőséges folyadékfogyasztás segíti az acetilcisztein nyákköldő hatását.

Amennyiben az orvos másképp nem rendel, a következő napi adagok ajánlottak:

*Felnőtteknek és 14 éven felüli gyermekeknek:*

Naponta 3-szor 2 tasak granulátum.

*6-14 éves kor közötti gyermekeknek:*

Naponta 2-szer 2 tasak granulátum, vagy naponta 3-szor 1 tasak granulátum.

*2-6 éves kor közötti gyermekeknek:*

Naponta 2-3-szor 1 tasak granulátum.

*1-2 éves kor közötti gyermekeknek:*

Naponta 2-3-szor 1/2 tasak granulátum.

Ha az előírtnál több ACC 100 granulátumot vett be, azonnal forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez!

Ha adagját elfelejtette bevenni, a következő alkalommal ne vegyen be dupla adagot, mert ezzel már nem pótolja a kiesett mennyiséget, viszont a túlادagolás veszélyének teszi ki magát.

## Milyen nemkívánt hatásai lehetnek az ACC 100 granulátumnak és mi a teendő, ha ezek jelentkeznek?

Mint minden gyógyszernek, az ACC 100 granulátumnak is lehetnek mellékhatásai.

Ritkán fejfájás, szájnyalvákahártya gyulladás és fülzúgás jelentkezhet.

Egyes esetekben hasmenés, gyomorégés, hányinger, hányás fordulhat elő.

Mellékhatások vagy bármilyen szokatlan tünet jelentkezéséről tájékoztassa orvosát!

Minden gyógyszerrel szemben kialakulhat túlérzékenységi reakció. Ezért felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben a következő tünetek bármelyikét észleli: vérnyomásesés, hörgőgörcs, bőrkiütés, csalánkiütés, viszketés, szapora szívverés, hagyja abba a gyógyszer szedését és feltétlenül forduljon kezelőorvosához!

## Hogyan kell az ACC 100 granulátumot tárolni?

Szobahőmérsékleten, 25 °C alatt kell tárolni.

A gyógyszert a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni.

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

Sandoz Hungária Kft., 1034 Budapest, Tímár utca 20, Magyarország

OGYI-T-2021/01-02

A beteg tájékoztató engedélyezésének dátuma:

2008. március 13.