



Mielőtt elkezdené gyógyszerét alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót. Ez a gyógyszer orvosi vény nélkül kapható. Az optimális hatás érdekében azonban elengedhetetlen a gyógyszer körültekintő és szakszerű alkalmazása. Tartsa meg a beteg-tájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet. További kérdéseivel forduljon gyógyszerészéhez. Sürgősen keresse fel orvosát, ha tünetei (két héten belül) nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.

Hatóanyaga: 50 mg etofenamát 1 g gélben.

Segédanyagok: Nátrium-hidroxid, karbomer 940, makrogol 400, zsírsav-poliglikol-éter, izopropil-alkohol, tisztított víz.

Milyen típusú gyógyszer a Rheumon gél?

A Rheumon gél a reumás megbetegedések külsőleges, helyi kezelésére szolgáló gyógyszer. Hatóanyaga, az etofenamát a nemszteroid gyulladáscsökkentő gyógyszerek csoportjába tartozik, gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító hatással rendelkezik.

Milyen betegségek esetén alkalmazható?

A váz-izomrendszer lágyrészeiben kialakuló (mozgásszervi) reumás megbetegedések kezelésére:

A reumás megbetegedések kifejezés nagyszámú betegséget foglal magába. Ide tartoznak az izom-reumatizmusok, a váll körüli izmok feszességével járó betegségek (periarthropathia humeroscapularis), a derékfájás különböző fajtái, mint a lumbágó, az isiászos megbetegedések, az ínhüvely és nyálkatömlők gyulladása, továbbá a gerincoszlop és más ízületek kopási és túlterheléses esetei (arthrosisok, spondylosisok).

Az izmok tompa, rándódással járó sérülései a fájdalommal, duzzadással esetleg vérömleny kialakulásával járó húzóadás, rándulások és szakadások kezelésére, melyek gyakran előfordulhatnak a napi munka és sportolás során.

Milyen esetekben nem alkalmazható a Rheumon gél készítmény?

Ne alkalmazza a Rheumon gél készítményt a következő esetekben:

- A hatóanyaggal, azaz az etofenamáttal, flufenaminsavval, propilénlikollal vagy más nem szteroid gyulladáscsökkentővel szemben ismert túlérzékenység esetén, valamint a készítmény bármely összetevőjével szembeni túlérzékenység esetén.
- terhesség esetén.
- A gyógyszer alkalmazása gyermekek számára ellenjavallt.
- Nem szabad sérült, viszkető, vagy gyulladt bőrre alkalmazni.

Mire kell figyelemmel lenni terhesség vagy szoptatás idején?

Mivel emberi terhességben megfelelő adatok nem állnak rendelkezésre, és állatkísérletekben a magzat károsodását észlelték, ezért a készítmény nem alkalmazható a terhesség folyamán.

Szoptatás alatt a Rheumon gél csak kis testfelületre és rövid ideig alkalmazható.

Mire kell még figyelni a gyógyszer alkalmazásakor?

Szembe nem kerülhet!

A Rheumon gél a politürozott bútorokon, és műanyag felületeken elszíneződést és felületi elváltozást okozhat, ezért a gél felvitele után ajánlott kezét mosni, illetve kerülni a megnevezett felületek érintését.

Hogyan és mennyit kell alkalmazni a Rheumon gél készítményből?

A Rheumon gél alkalmazandó mennyisége a betegség vagy az elváltozás nagyságától, a panaszok súlyosságától függ, ami betegenként természetesen különböző lehet. Ha az orvos másként nem rendel, az alábbi módon alkalmazza a készítményt:

A fájdalmas terület nagyságától és a fájdalom mértékétől függően naponta többször háromszor-négyszer 5-10 cm-nyi mennyiséget dörzsöljünk be egyenletesen az érintett bőrfelületre.

Milyen hosszú ideig lehet alkalmazni a Rheumon gél készítményt?

Reumás megbetegedésekben az alkalmazás tartama leggyakrabban 3-4 hét, ugyanakkor tompa, sportsérüléseknél 2 hét elegendő. Ha a panaszok továbbra is fennállnak, a további kezelésről kérdezze meg orvosát.

Mi a teendő, ha véletlenül túl sokat használt volna a Rheumon gél készítményből?

Ha egy tubus tartalmát, vagy még ennél is többet alkalmazott volna a teljes testfelületre rövid időn belül, fejfájás, szédülés és hasi panaszok felléphetnek. Ebben az esetben bő vízzel mossa le a készítményt a bőréről.

A készítmény íze miatt a mérgezés lehetőségének szempontjából jelentős adag szervezetbe kerülése nem valószínű, de ha mégis előfordulna, gyomormosást, hánytatást és aktív szénnel történő kezelést kell alkalmazni

Milyen mellékhatások fordulhatnak elő a Rheumon gél alkalmazásakor?

Egyes esetekben a bőr kipirulása, nagyon ritkán allergiás bőrreakciók léphetnek fel (pl. erős viszketés, bőrpír, duzzanat, kiütések, hólyagképződés).

A készítményalkalmazásának abbahagyása után a bőrtünetek általában gyorsan elmúlnak, így speciális kezelésre nincs szükség.

Amennyiben a betegájékoztatóban nem szereplő mellékhatásokat tapasztalna, forduljon kezelőorvosához, vagy gyógyszerészéhez!

A gyógyszer eltarthatóságával kapcsolatos tudnivalók.

Eltartás: különleges tárolást nem igényel.

A gyógyszert a csomagoláson feltüntetett lejárati időn túl nem szabad alkalmazni. A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!

Forgalombahozatali engedély jogosultja: Goodwill Pharma Ltd.

Gyártó: Meda Manufacturing GmbH, Németország

OGYI-T-1931/01

Betegájékoztató OGYI-eng. száma: 17.499/55/2002