

Mielőtt elkezdené gyógyszerét szedni olvassa el figyelmesen az alábbi betegájékoztatót.

- Ez a gyógyszer orvosi rendelvény nélkül kapható. Az optimális hatás érdekében azonban elengedhetetlen a gyógyszer körültekintő és szakszerű alkalmazása.
- Tartsa meg a betegájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.
- További kérdéseivel forduljon gyógyszerészéhez.
- Sürgősen keresse fel orvosát, ha tünetei 3 napon belül nem enyhülnek vagy éppen súlyosbodnak.

A betegájékoztató tartalma:

1. Milyen betegségek esetén alkalmazható és hogyan fejt ki hatását a Halset tabletta?
2. Tudnivalók a készítmény alkalmazása előtt
3. Hogyan kell alkalmazni a tablettát?
4. Lehetséges mellékhatások
5. Tárolás

Halset®

tabletta

Hatóanyag: 1,5 mg cetilpiridinium-klorid monohidrát tablettánként

Segédanyagok: racém mentol, borsmentaolaj, magnézium-sztearát, szorbit

A forgalombahozatali engedély jogosultja:
Gebro Pharma GmbH, Fieberbrunn

Gyártó: Gebro Pharma GmbH, Fieberbrunn

1. Milyen betegségek esetén alkalmazható és hogyan fejt ki hatását a Halset tabletta?

Száj- és garatüreg enyhe és közép súlyos fertőzőes megbetegedései esetén, mint torokgyulladás, fogínygyulladás, szájnyálkahártya gyulladás, rekedtség.

A cetilpiridin baktériumölő hatású, nagy felületaktivitással rendelkező molekula, ami könnyen bejut a száj- és garatüreg nyálkahártyájába, annak mélyebb rétegeibe is.

A mentol és a borsmentaolaj megszüntetik a száj és torokgyulladással járó kellemetlen lehetet.

2. Tudnivalók a készítmény alkalmazása előtt

Ne alkalmazza a készítményt:

- ha túlérzékeny a készítmény hatóanyagára vagy bármely segédanyagára
- gyümölcscukor túlérzékenység esetén
- 6 év alatti életkorban.

A Halset tabletta együttes alkalmazása étellel/italal

A cetilpiridin baktérium elleni hatását az egyidejűleg alkalmazott felületaktív anyagok, pl . fogkrém, csökkentik. Ezért legalább 30 perc teljen el a fogmosás és a Halset alkalmazása között.

Terhesség, szoptatás

Terhesség és szoptatás ideje alatt alkalmazása nem javasolt.

A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és gépek kezeléséhez szükséges képességekre

Nem befolyásolja a vezetési és gépkezelési képességeket.

Fontos információk a tabletta egyes összetevőiről:

Cukorbetegeknek is adható, mivel édesítőszerként 742,35 mg szorbitot (0,06BU) tartalmaz tablettánként.

Szorbit tartalma miatt gyümölcscukor túlérzékenységben, valamint gyümölcscukor bontó enzim hiányában alkalmazása nem javallt.

A kezelés ideje alatt szedett egyéb gyógyszerek:

Gyógyszerkölsönhatások nem ismertek.

3. Hogyan kell alkalmazni a tablettát?

Az alábbiakban megadott adagolást pontosan be kell tartani. Amennyiben az orvos másképp nem rendeli szokásos adagja:

Felnőtteknek és 12 éven felüli gyerekeknek
kb. 1–2 óránként ajánlott 1 tablettát lassan

elszopogatni, egy nap alatt maximum 8 tablettát.

6 és 12 éves kor között: kb. 2–3 óránként ajánlott 1 tablettát lassan elszopogatni, egy nap alatt maximum 6 tablettát.

Ha a tabletták alkalmazása során hatását túlzottan erősnek érzi, vagy a készítmény csekély hatásúnak bizonyul, forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez.

Ha az előírtnál több gyógyszert vett be:

Túladagolás esetén a száj nyálkahártyán ill. a nyelven égő érzés jelentkezhet. Főként gyermekkorban a szorbít tartalom miatt hasmenés jelentkezhet.

Ha adagját elfelejtette bevenni:

Következő alkalommal ne vegyen be dupla adagot, mert ezzel már nem pótolja a kiesett mennyiséget, viszont a túladagolás veszélyének tenné ki magát.

4. Lehetséges mellékhatások

Mint minden gyógyszernek, a Halsetnek is lehetnek mellékhatásai.

Nagyon ritkán allergiás reakció léphet fel, mint pl. bőrkiütés. Egyes esetekben átmeneti ízérzékelési zavart okozhat. Előfordulhat a fogak átmeneti barnás elszíneződése, ami rendszeres fogmosással elkerülhető. A szorbít tartalom miatt előfordulhat hasmenés.

Ha az itt felsoroltakon kívül más mellékhatást észlel, hagyja abba a gyógyszer alkalmazását és forduljon kezelőorvosához.

5. Tárolás

Szobahőmérsékleten, 25 °C alatt tartandó.

A készítmény csak a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül használható fel.

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó.

OGYI-T.: 4106/01-02

Betegtájékoztató OGYI-eng. száma:
29 303/55/2003